

Acetylcysteinum Flegamina 600 mg, 10 tabletek

Cena: 11,43 zł



Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki musujące
Producent	TEVA B.V.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acetylcysteinum
Wiek	od 14 roku życia

Opis produktu

Opis

Acetylcysteinum Flegamina zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która jest lekiem rozrzedzającym uporczywy śluz w drogach oddechowych. Wskazana jest u młodzieży w wieku powyżej 14 lat i dorosłych do rozrzedzania śluzu i ułatwiania jego odkrztuszenia w zapaleniu oskrzeli wywołanym przeziębieniem z towarzyszącą uporczywą wydzieliną dróg oddechowych i zmniejszonym transportem śluzu.

Wskazania

Rozrzedzenie wydzieliny dróg oddechowych i ułatwienie jej odkrztuszenia u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Działanie

Rozrzedza wydzielinę dróg oddechowych i ułatwia jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Dawkowanie

- Młodzież w wieku od 14 lat i dorośli - 1 tabletkę musującą raz na dobę.
- Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody, a następnie wypić zawartość całej szklanki.
- Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.
- Nie stosować dłużej niż 5 dni

Skład

Substancją czynną leku jest: acetylocysteina., 1 tabletkę musującą zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy, sodu wodorowęglan, kwas adypinowy, powidon K-25, aspartam (E 951), aromat cytrynowy (zawiera maltodekstrynę, sacharozę, gumę arabską (E 414), triacetynę (E 1518), alfa-tokoferol (E 307)).

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 12 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dodatkowe informacje

- Ten lek zawiera 150 mg sodu (główny składnik soli kuchennej) w każdej tabletkie musującej.
- Zawiera 20 mg aspartamu w każdej tabletkie musującej