


# Acidolit smak malinowy dla niemowląt, dzieci i dorosłych, proszek, 10 saszetek



Cena: 20,95 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek do przygotowania roztworu doustnego
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	dla niemowląt

## Opis produktu

### Opis

Acidolit, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych. Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci). Może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.

### Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

### Zalecane spożycie

Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczką. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Nie spożywać więcej niż 6 saszetek na dobę.

- Dziecko do 4 kg: 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.
- Dziecko 4 – 8 kg: 50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.
- Dziecko 8 – 12 kg: 100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.
- Dziecko powyżej 12 kg: 100 ml – 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

### Skład

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny.

100 g produktu zawiera: wartość energetyczna 1328 kJ/312kcal, węglowodany (glukoza) 71 g, skrobia 0,9 g, sól 15,9 g, sód 6,36 g

### Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze od 15 do 25 . Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

### Dodatkowe informacje

- Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonny do alergii podawać Acidolit w wersji bezsmakowej.
- Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.
- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.