

Acne-Derm, krem, trądzik, przebarwienia skóry, 20 g

Cena: 19,99 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	20 g
Postać	krem
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Rejestracja	kosmetyk

Opis produktu

Opis produktu

Acne-Derm, kosmetyk w postaci kremu do stosowania miejscowego na skórę. Zawarty w kremie glicerol działa silnie nawilżająco i zmiękcza skórę. Kwas azelainowy: działa przeciwtrądzikowo oraz wybielająco na skórę w przypadku jej przebarwienia, niszczy bakterie wpływające na rozwój trądziku (*Propionibacterium acnes*), zmniejsza liczbę mikrozaskórników oraz hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, hamuje wzrost i nadczynność komórek barwnikowych skóry (melanocytów).

Zastosowanie

- Trądzik pospolity,
- Przebarwienia skóry (hiperpigmentacja).

Składniki

Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.

Pozostałe składniki to: mieszanina glicerolu monostearnianu i makrogolu stearynianu; mieszanina glicerolu stearynianu, alkoholu cetostearylowego, cetylu palmitynianu i kokoglicerydów; mieszanina cetostearylu etyloheksanianu i izopropylu myrystynianu; glikol propylenowy; glicerol; kwas benzoesowy; woda oczyszczona.

Sposób użycia

- Stosować miejscowo na skórę.
- Na umytą i osuszoną skórę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) nakładać krem delikatnie wcierając w chorobowo zmienione miejsca skóry. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce. Jednorazowo należy nakładać pasek kremu o długości 4 cm (1 g kremu). Maksymalnie na dobę można zastosować pasek kremu o długości 8 cm (2 g kremu).
- Pacjenci ze skórą wrażliwą przez pierwszy tydzień leczenia powinni stosować lek tylko raz na dobę - wieczorem.
- W przypadku zmian trądzikowych występujących na klatce piersiowej i (lub) plecach nie należy stosować więcej niż 10 g kremu na dobę (nie więcej niż pół tubki kremu na dobę). W przypadku leczenia trądziku poprawa powinna być widoczna po upływie 4 tygodni, natomiast w przypadku leczenia przebarwień po około 3 miesiącach.

- W celu uzyskania trwałej poprawy lek powinien być stosowany przez kilka miesięcy. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 6 miesięcy. Jeśli po upływie wyżej wymienionych okresów stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

- Nie stosować w przypadku uczulenia na kwas azelainowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.