Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

Aescin 20 mg, 30 tabletek powlekanych

Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Escinum

Opis produktu

Opis
Aescin, lek w postaci tabletek powlekanych zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych. Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Poprawia krążenie żylno-limfatyczne. Aescin, lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

Wskazania

Leczenie:
- zapalenia żył kończyn dolnych,
- przewlekłej niewydolności żylnej,
- żylaków kończyn dolnych,
- żylaków odbytu,
Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Działanie
Przeciwobrzękowe i przeciwzapalne oraz poprawa stanu napięcia naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.
Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.
W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfaescyny.

Skład
Substancją czynną leku jest alfa-escyna.
Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110), silikonowa emulsja przeciwpienna.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Kobiety w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat.

Działania niepożądane
Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

- niezbyt często – u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów: zawroty głowy, ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w

żołądku,

- rzadko – u 1 do 10 pacjentów na 10 000: alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka),
- bardzo rzadko – mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów: ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem); tachykardia,

nadciśnienie tętnicze; reakcje nadwrażliwości; krwotok z dróg rodnych,

- nieznana – częstość nie może być określona na odstawie dostępnych danych.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.