Apteka NAMEX

Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

Aescin (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/ g, żel z heparyną, 40 g

Cena: 24,63 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	40 g
Opakowanie	40 g
Postać	żel
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Escinum, Diethylamini salicylas, Heparinum natricum

Opis produktu

Opis
Aescin, lek w postaci żelu stosowany w leczeniu żył, obrzęków pooperacyjnych w kończynach dolnych, krwiaków. Zawarte substancje czynne m.in. zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych oraz działają hamująco na fazy krzepnięcia krwi.

Wskazania
Do stosowania miejscowo, w leczeniu wspomagającym:

- Urazów takich jak stłuczenia i skręcenia,
- Miejscowych stanów zapalnych z obrzękiem lub bez obrzęku,
- Krwiaków i obrzęków po zabiegach chirurgicznych oraz po urazach,
- Zapalenia żył kończyn dolnych,
- Bólów kręgosłupa z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych.

Działanie
Przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, chroniące naczynia żylne.

Dawkowanie

- Stosować miejscowo na skórę, średnio 3-5 razy na dobę.
- W chorym miejscu i okolicach nanieść cienką warstwę leku, a następnie wetrzeć.
- Wykonany masaż przed zastosowaniem przyspiesza wchłanianie substancji czynnej.

Skład
1 gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny (Escinum), 50 j.m. heparyny (Heparinum), 50 mg salicylanu dwuetyloaminy (Diethylamini salicylas).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Ciąża i pierwszy trymestr ciąży.
- Nie stosować miejscowo na błony śluzowe, na otwarte rany oraz w przypadkach martwicy skóry.
- Nie stosować na obszary skóry poddane napromienianiu.
- Nie stosować u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, niewydolnością nerek .

Działania niepożądane
W miejscu stosowania mogą wystąpić bardzo rzadko: świąd, pokrzywka, uczucie pieczenia.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25^{o}C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.