


Alergo Teva 5 mg, 10 tabletek powlekanych

Cena: 7,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum

Opis produktu

Wskazania

- Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych.
- Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Działanie

Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.
- Stosować doustnie, tabletkę należy połykać w całości.
- Lekarz lub farmaceuta określi czas trwania leczenia lekiem po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które występuje u pacjenta.
- Nie należy przyjmować leku dłużej niż 10 dni, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Każda tabletkę powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, mannitol, talk, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak.

Przeciwwskazania

Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.

Działania niepożądane

- Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko zgłaszano przypadki ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk). Jeśli wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.
- W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednak uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądany był ból głowy.
- Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból głowy.

Dorośli: po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

- Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne, szybkie bicie serca, wymioty, zawroty głowy, ból mięśni, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, wysypka, ból brzucha, rozstrój żołądka, senność, omamy, zapalenie wątroby, kołatanie lub nieregularne bicie serca, nudności, biegunka, bezsenność, drgawki, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): nietypowe osłabienie, zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych, zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium, zmiana w sposobie bicia serca.

Dzieci: nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarzką jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.