

# Aleric Deslo Active 0,5 mg/ ml, roztwór doustny, dla dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz osób dorosłych, 60 ml



Cena: 19,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	60 ml
Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	60 ml
Postać	roztwór doustny
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Aleric Deslo Active, roztwór doustny, lek przeciwalergiczny, nie wywołujący senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

### Wskazania

- Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat oraz starszych.
- Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki.

- Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka 10 ml (dwie łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

### Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 0,5 mg w 1 ml.  
Pozostałe składniki leku to: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.
- Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

### Działania niepożądane

- U większości dzieci i dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu roztworu lub tabletki, które nie zawierają substancji czynnej. Jednakże u dzieci w wieku poniżej 2 lat częstymi działaniami niepożądanymi były: biegunka, gorączka i bezsenność, natomiast u dorosłych pacjentów: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i ból głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej.
- Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością

ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Alreic Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.