

Aleric Deslo Active 2,5 mg, dla dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz osób dorosłych, 10 tabletek



Cena: 13,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	2,5 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Aleric Deslo Active, to lek przeciwalergiczne, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrole reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Wskazania

- Objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
- Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Działanie

Przeciwalergiczne

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 2 tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletki raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Skład

- Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.
- Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroscarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.
- Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

- U dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

- Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów: zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból głowy

Po wprowadzeniu leku Aleric Deslo Active do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

- Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów: ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, kołatanie oraz nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowości w testach czynności wątroby.
- Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: zwiększona wrażliwość skóry na słońce lub promieniowanie UV (ultrafioletowe).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- Jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.