

# Aleric Spray 50 µg/dawkę, aerozol do nosa, dla osób dorosłych, 60 dawek



Cena: 9,99 zł

## Opis słownikowy

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Opakowanie        | 60 dawek              |
| Postać            | aerozol do nosa       |
| Producent         | USP ZDROWIE SP. Z O.O |
| Rejestracja       | Lek                   |
| Substancja czynna | Mometasonum           |
| Wiek              | od 18 roku życia      |

## Opis produktu

### Opis

Aleric Spray jest lekiem zawierającym mometazonu furoinian, należącym do grupy leków kortykosteroidami. Lek do stosowania miejscowego w formie aerozolu do nosa. Łagodzi on objawy zapalenia błon śluzowych nosa, w tym: obrzęk i podrażnienie, kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa. Aleric jest lekiem sterydowym o działaniu przeciwapalnym, który u źródła dezaktywuje reakcje alergiczne i zwalcza objawy alergii. Wystarczy jedna aplikacja na 24h.

### Wskazania

Data ważności: 30.04.2024

Leczenie objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego także katarem siennym) u osób dorosłych w wieku od 18 lat.

### Działanie

Łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

### Dawkowanie

Stosowanie u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat):

- Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.
- Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę: stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dawka ta powinna być skuteczna w leczeniu podtrzymującym.
- U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki tego leku, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie pojawić się w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.

- Jeżeli po maksymalnie 14 dniach stosowania leku pacjent nie odczuwa poprawy lub odczuwa pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem.
- Maksymalny czas stosowania tego leku bez konsultacji z lekarzem wynosi 3 miesiące.

### Skład

- Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Każda dostarczana dawka zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu, w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego.
- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, roztwór, glicerol, polisorbat 80, celuloza mikrokryształiczna i karmeloza sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa;
- Stosowanie leku Aleric Spray w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia.
- Jeśli pacjent przechodził niedawno chirurgiczny zabieg nosa lub uraz nosa;
- Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.
- Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

### Działania niepożądane

- Po zastosowaniu tego leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne) o częstości nieznaney.
- Reakcje te mogą być ciężkie. Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, problemy z przełykaniem, pokrzywka, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- ból głowy,
- kichanie,
- krwawienie z nosa (występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę),
- podrażniony nos lub gardło, ból gardła,
- owrzodzenie błony śluzowej nosa,
- zakażenie górnych dróg oddechowych.

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia,
- uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza,
- zaburzenia smaku i węchu,
- nieostre widzenie.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.