

# Allefin, żel, na stany zapalne i alergiczne skóry, 30 g



Cena: 23,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	0,02g+0,01g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diphenhydramini hydrochloridum, Lidocaini hydrochloridum
Wiek	od 2 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Allefin żel jest lekiem przeznaczonym do stosowania miejscowego na skórę. Preparat ma postać żelu i łączy w sobie działanie dwóch substancji czynnych, takich jak difenhydraminy chlorowodorek i lidokainy chlorowodorek jednowodny.

- Difenhydraminy chlorowodorek- obniża działanie histaminy, która odpowiada za takie objawy jak: obrzęki, skurcz oskrzeli, świąd czy zaczerwienienia.
- Lidokainy chlorowodorek jednowodny- o działaniu miejscowo znieczulającym.

### Wskazania

W objawowym leczeniu zmian zapalnych i alergicznych skóry, z towarzyszącym świądem, w następstwie ukąszeń owadów, a także kontaktu z roślinami np. pokrzywa.

Do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat.

### Działanie

Przeciwświądowe, przeciwalergiczne, miejscowo znieczulające.

### Dawkowanie

Stosować w zależności od potrzeb 2 lub 3 razy na dobę. Niewielka ilość żelu nanieść na zmienione miejsce na skórze i delikatnie rozprowadzić.

### Skład

1 g zelu zawiera 20 mg difenhydraminy chlorowodoru (Diphenhydramini hydrochloridum) i 10 mg lidokainy chlorowodoru jednowodnego (Lidocaini hydrochloridum monohydricum).

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy (E 1520), hydroksyetyloceluloza, olejek eteryczny cytronelowy, disodu edetynian, woda oczyszczona.

#### **Przechowywanie**

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Po pierwszym otwarciu tuby okres ważności: 3 lata, ale nie dłużej niż termin ważności podany na opakowaniu.
- W sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.