

# Allertec WZF 10 mg, 10 tabletek powlekanych



Cena: 10,55 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetirizinum

## Opis produktu

### Opis

Allertec WZF, lek przeciwalergiczny dla dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej.

### Wskazania

Łagodzenie objawów nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, objawów idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

### Działanie

Przeciwalergiczne.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletki powlekanej) raz na dobę.
- Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek: dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta.
- Tabletkę połykać popijając szklanką wody, niezależnie od posiłku.

### Skład

Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletki powlekanej zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000. Lek zawiera laktozę.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na cetyryzyny, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.
- Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

- Cięża i okres karmienia piersią - po konsultacji z lekarzem.

#### **Działania niepożądane**

Jeśli u pacjenta wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący trudności w oddychaniu lub przełykaniu), należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy takie występują rzadko. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów i zdecyduje, czy konieczne będzie podjęcie dalszego postępowania.

- Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób): zmęczenie, suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka, zawroty głowy, bóle głowy, senność, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa.
- Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): ból brzucha, astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie, zaburzenia czucia, pobudzenie, świąd, wysypka.
- Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): przyspieszone bicie serca, obrzęki, uczulenie, czasami ciężkie (bardzo rzadko), nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie masy ciała, drgawki, zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność, pokrzywka.
- Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych), omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), dyskineza (ruchy mimowolne), tiki, zaburzenia oddawania moczu, obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja (utrata pamięci), zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu.

#### **Przechowywanie**

W sposób niedostępny dla dzieci.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.