

Alliofil 200 mg + 53,5 mg, na przeziębienie, 30 tabletek dojelitowych



Cena: 9,85 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg + 53,5 mg
Opakowanie	30 tabletek dojelitowych
Postać	tabletki dojelitowe
Producent	POZNAŃSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Allii sativi bulbus, Urtice folium
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Profilaktycznie oraz wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe).

Działanie

Wspomagające odporność organizmu oraz w stanach przeziębienia.

Dawkowanie

- W profilaktyce infekcji górnych dróg oddechowych: dorośli 3 razy dziennie po 1 tabletkę.
- Wspomagająco w łagodnych infekcjach górnych dróg oddechowych (stany przeziębieniowe): dorośli 3 razy dziennie 1 do 3 tabletek. Lek przyjmować po głównych posiłkach. Nie należy rozgryzać tabletek.
- W celach profilaktycznych lek można stosować bez konsultacji z lekarzem do 6 miesięcy. W przypadku stosowania leku w celach leczniczych w stanach przeziębieniowych jeśli objawy nie poprawią się po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: 200 mg Allium sativum L., bulbus (cebula czosnku) i 53,5 mg Urtica dioica L., folium (liść pokrzywy).
Substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną z krzemionką koloidalną bezwodną, magnezu stearynian, powidon, kroscarmelozę sodową, acetylocelulozy ftalan, trietylu cytrynian, polisorbat 80, lak indygotyny E 132, lak żółcieni chinolinowej E 104.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- Uczulenie na związki siarkowe,

- Niewydolność wątroby, astmę oskrzelową lub alergię pokarmową.
- Związki siarkowe czosnku wydalone są przez skórę z potem oraz przez płuca, co w konsekwencji powoduje zmianę zapachu skóry i oddechu.

Działania niepożądane

W trakcie stosowania możliwe jest wystąpienie oddechowych i skórnych odczynów alergicznych oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Przechowywanie

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas stosowania preparatu związki siarkowe wydalone są przez skórę z potem i przez płuca. Powoduje to zmianę zapachu skóry i oddechu.
- Zastosowanie leku u młodzieży poniżej 18 lat wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.