Alopexy 5 % 50 mg/ ml, roztwór do stosowania na skórę, na łysienie u mężczyzn, 60 ml

Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	50 mg/ ml
Opakowanie	60ml
Postać	roztwór do stosowania na skórę
Producent	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Minoxidilum

Opis produktu

Wskazania
W pewnych przypadkach łysienia androgenowego (nadmiernego wypadania włosów) o umiarkowanym nasileniu u mężczyzn.

Działanie
Pobudzenie wzrostu włosów u pewnej grupy pacjentów z łysieniem androgenowym.

Dawkowanie

- Nanosić 1 ml roztworu rano i 1 ml roztworu wieczorem.
- Do stosowania zewnętrznego. Podanie na skórę.
- Przed i po naniesieniu roztworu na skórę głowy, należy dokładnie umyć ręce.
- Przed zastosowaniem leku włosy i owłosioną skórę głowy należy dokładnie wysuszyć.
- Lek nanosić koniuszkami palców, na całą leczoną powierzchnię skóry, zaczynając od środka leczonej powierzchni.
- Nie stosować leku na jakąkolwiek inną część ciała.
- We wszystkich przypadkach należy ściśle przestrzegać dawek.
- Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczna terapia polegająca na stosowaniu leku dwa razy na dobę przez okres 2 miesięcy.

Skład
Substancją czynną leku jest minoksydyl.
Pozostałe składniki: glikol propylenowy, etanol 96%, wodę oczyszczoną.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (minoksydyl) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

- Jeśli pacjent źle tolerował 2% roztwór minoksydylu.
- Jeśli u pacjenta występują uszkodzenia skóry owłosionej głowy.

Działania niepożądane

- Bardzo często: mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób: nadmierne owłosienie (nadmierny porost włosów) w miejscach gdzie nie stosowano leku, zwłaszcza,

jeżeli lek jest stosowany u kobiet.

- Często: mogą występować do 1 na 10 osób: miejscowe reakcje skórne w miejscu podania jak: miejscowe podrażnienie ze złuszczaniem naskórka (eliminacja martwych komórek naskórka), świąd, zaczerwienienie skóry, zapalenie skóry, suchość skóry, reakcje alergiczne skóry ze względu na obecność glikolu propylenowego, stany zapalne skóry, wysypka przypominająca trądzik, bóle mięśniowo-szkieletowe, obrzęki obwodowe (zatrzymanie płynów w tkankach), trudności z oddychaniem oraz depresja.
- Często nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: infekcje ucha, zapalenie ucha zewnętrznego, zapalenie śluzówki nosa, nadwrażliwość, zapalenie nerwu, uczucie mrowienia, zaburzenia smaku, uczucie pieczenia, zaburzenia widzenia, podrażnienie oczu, zawroty głowy, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszone tętno, ból w klatce piersiowej, osłabienie, obrzęk twarzy (zatrzymanie płynów w tkankach), rumień, wysypka, wypadanie włosów, nierównomierny wzrost włosów, zmiana koloru włosów, zmiana tekstury włosów, zapalenie wątroby i kamica nerkowa.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet ze względu na częste występowanie nadmiernego owłosienia poza miejscami jego stosowania.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.