

Altabactin 250 j.m. + 5 mg/ g, maść, 5 g



Cena: 12,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	5 g
Dawka	(250j.m.+5mg)/g
Opakowanie	5 g
Postać	maść
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Bacitracinum, Neomycinum

Opis produktu

Opis

Altabactin, maść do stosowania miejscowego na skórę. Substancje czynne bacytracyna i neomycyna działają przeciwbakteryjnie. Bacytracyna zabija przede wszystkim bakterie Gram-dodatnie, a neomycyna zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne. Altabactin nie działa na grzyby i wirusy.

Wskazania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń małych powierzchni skóry (jak np. zakażenie niewielkich ran, zakażenie skóry w przebiegu odmrożeń i oparzeń).

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

- Stosować od 2 do 3 razy na dobę.
- Cienką warstwę maści należy nakładać na chorobowo zmienione miejsce na skórze. W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem.
- Nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Nie należy stosować więcej niż 1 g neomycyny na dobę (co odpowiada 200 g leku Altabactin).

Skład

Substancjami czynnymi są: bacytracyna i neomycyna.
1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny i 5 mg neomycyny.
Pozostałe składniki to: lanolina i parafina ciekła.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie;
- Ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek;
- Stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka);
- Jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści do ucha zewnętrznego;
- Do oczu i na błony śluzowe;
- Na rany głębokie lub kłute, sączące zmiany chorobowe;
- Ciężkie oparzenia;
- Duże powierzchnie uszkodzonej skóry;
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): reakcje alergiczne, głównie w postaci kontaktowego zapalenia skóry; u 50%osób uczulonych na neomycynę występuje uczulenie na inne antybiotyki aminoglikozydowe.
- Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje uczuleniowe, takie jak rumień (czerwono-sine plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami), nadmierna suchość i łuszczenie skóry, wysypka skórna i świąd; szkodliwe działanie na nerki, narząd słuchu lub układ nerwowy (uszkodzenie nerwu przedsionkowego, blokada nerwowomięśniowa). Reakcje alergiczne mogą być przyczyną rozszerzania się zmian chorobowych lub braku wyników leczenia lekiem Altabactin.

Istnieje ryzyko uczulenia na światło lub reakcji fototoksycznych w przypadku przebywania na słońcu lub opalania się w solarium (promieniowanie UV).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze do 25°C. Chronić przed światłem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.