

Alugastrin Max Protect, przeciwrefluksowa zawiesina doustna, 10 saszetek



Cena: 20,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek po 10 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	URGO SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis produktu

Alugastrin Max Protect to wyrób medyczny zawierający alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu i węglan wapnia, stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego. Preparat blokuje kwaśny refluks, zmniejsza zgagę i działa ochronnie na błony śluzowe przełyku. Alginian sodu i węglany sodu- w kontakcie z kwaśnym pH żołądka wykazuje mechaniczne działanie, alginian sodu ulega żelowaniu, a węglany uwalniają dwutlenek węgla, który transportuje cząstki żelu na powierzchnię treści żołądkowej, dzięki czemu następuje mechaniczne zablokowanie przedostawania się treści żołądkowej do przełyku. Ponadto obecność wodorowęglanu zmniejsza kwasowość w żołądku.

Wyrób medyczny Alugastrin Max Protect nie zawiera laktozy i glutenu. Może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Zastosowanie

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak:

- zgaga w okresie ciąży,
- zgaga,
- refluksowe zapalenie przełyku;
- zarzucanie treści żołądkowej do przełyku,
- niestrawność,
- nocne objawy refluksu,
- kaszel,
- zapalenie krtani i gardła.

Sposób użycia

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 lub 2 saszetki po głównych posiłkach i przed snem. Wstrząsnąć przed użyciem.

Składniki

Woda oczyszczona, alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan sodu, węglan wapnia, aromat, kwas poliakrylowy, propylu parahydroksybenzoesan sodu, metylu parahydroksybenzoesan sodu, sacharynian sodu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
- Produkt może zmieniać wchłanianie niektórych doustnych leków.
- W każdym przypadku należy uwzględnić dwugodzinny odstęp między przyjęciem produktu, a podaniem innego leku.
- Produkt może powodować wzdęcia.

Środki ostrożności dotyczące wyrobu medycznego

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.