

Amaderm Lanolina+E maść, 10 g



Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	10 g
Postać	maść
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	kosmetyk

Opis produktu

Opis produktu

Amaderm Lanolina+E to maść o właściwościach ochronnych, zmiękczejących i natłuszczających. Lanolina posiada właściwości głęboko nawilżające i natłuszczające oraz zmiękczejące naskórek. Skutecznie łagodzi podrażnienia brodawek sutkowych, przyspiesza ich regenerację, jak również zmniejsza tkliwość oraz pozostawia uczucie komfortu. Skuteczny i bezpieczny dla mamy i dziecka, co potwierdziły badania – otrzymał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-F-5499 ważną do 31.10.2025. Nie wymaga zmywania i nie zawiera substancji zapachowych. Ponadto pielęgnuje i koi nadwrażliwą, popękaną skórę, pozostawiając na jej powierzchni ochronny film.

Działanie składników aktywnych:

- Lanolina – składnik aktywny o wielokierunkowym działaniu. Skutecznie nawilża skórę, dzięki obecności wolnych steroli oraz estrów kwasów tłuszczowych, wygładza, natłuszcza i zmiękcza naskórek. Pielęgnuje nadwrażliwą i popękaną skórę poprzez tworzenie ochronnego filmu na jej powierzchni.
- Tokoferol (witamina E) – wzmacnia barierę naskórkową wbudowując się w struktury lipidowe błon komórkowych i cementu międzykomórkowego warstwy rogowej. Zapobiega powstawaniu stanów zapalnych, regeneruje i poprawia ukrwienie skóry. Neutralizuje wolne rodniki i hamuje procesy starzenia się skóry wywoływane czynnikami zewnętrznymi.

Zastosowanie

Maść do pielęgnacji szorstkiej skóry oraz brodawek sutkowych.

Składniki

Lanolin, Tocopherol.

Sposób użycia

niewielką ilość preparatu nanieść na brodawki sutkowe oraz ich okolice i delikatnymi ruchami wmasować produkt. Stosować po karmieniu piersią celem złagodzenia objawów. Pozostawić do kolejnego karmienia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku wystąpienia ostrych stanów zapalnych naskórka brodawek sutkowych i skóry w obrębie gruczołu sutkowego wymagających leczenia farmakologicznego oraz w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.

Dodatkowe informacje

Zużyć w ciągu 6 miesięcy po otwarciu.