

Apap Migrena 250 mg+250 g+65 mg, 10 tabletek powlekanych



Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	250 mg+250 g+65 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum

Opis produktu

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury u dorosłych.

Działanie

Przecibólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli w wieku powyżej 18 lat:

- Ból głowy: 1 tabletkę. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4 - 6 godzin. Apap migrena jest przeznaczony do doraźnego stosowania w bólu głowy maksymalnie do 4 dni.
- Migrena: po wystąpieniu objawów przyjąć 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Apap migrena jest przeznaczony do doraźnego stosowania w migrenie, maksymalnie do 3 dni.
- W przypadku bólu głowy jak i migreny nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę. Produkt nie powinien być stosowany przez dłuższy okres lub w większych dawkach bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.
- Lek każdorazowo należy popić szklanką wody.

Skład

Paracetamol 250 mg, kwas acetylosalicylowy 250 mg, kofeina 65 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletkę powlekana zawiera: 0,24 mg glikolu propylenowego, 0,05 mg kwasu benzoowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, u pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa; czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów z owrzodzeniem żołądka w wywiadzie; hemofilia lub inne skazy krwotoczne; ciężka niewydolność wątroby lub ciężkie uszkodzenie lub niewydolność nerek (GFR <30ml/min/1,73m²);

ciężka niewydolność serca; przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień; trzeci trymestr ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat): nie zaleca się stosowania go u dzieci i młodzieży.
- Osoby w podeszłym wieku: zgodnie z ogólnymi zaleceniami medycznymi, u osób w podeszłym wieku (zwłaszcza o małej masie ciała) produkt leczniczy należy stosować ze szczególną ostrożnością. Niewydolność nerek i/lub wątroby: nie badano wpływu niewydolności nerek lub wątroby na farmakokinetykę produktu leczniczego Apap migrena. Ze względu na mechanizm działania paracetamolu i kwasu acetylosalicylowego przyjmowanie leku może nasilić niewydolność wątroby lub nerek. W związku z tym lek jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkim uszkodzeniem lub niewydolnością nerek (e.g. GFR <30ml/min/1,73m²) i ciężką niewydolnością wątroby i powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek (GFR <30ml/min/1,73m²) lub łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.
- Lek jest przeznaczony do doraźnego stosowania w bólu głowy maksymalnie do 4 dni, a w migrenie do 3 dni
- Lek zawiera paracetamol i kwas acetylosalicylowy. Nie należy zażywać leku razem z innymi lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy lub paracetamol
- Długotrwałe stosowanie leku bez nadzoru lekarza może być szkodliwe dla zdrowia
- Należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.