

Apetiherb 1,5 g/10 g, syrop, na brak łaknienia, 125 g



Cena: 20,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	125 g
Opakowanie	125 g
Postać	syrop
Producent	WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Productum compositum
Wiek	od 3 roku życia

Opis produktu

Opis

Apetiherb 1,5 g/10 g, lek w postaci syropu przeznaczony dla dzieci od 3 lat, młodzieży i osób dorosłych. Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w braku łaknienia.

Wskazania

Brak łaknienia u dzieci od 3 lat, młodzieży i osób dorosłych.

Działanie

Wyciąg z ziół zawierający związki goryczowe (ziele szanty, liść melisy, ziele krwawnika) oraz owoc kopru włoskiego, zwiększają wydzielanie soku żołądkowego wywołując łaknienie.

Dawkowanie

- Dzieci od 3 do 6 lat - 2 razy na dobę 2,5 ml miarką.
- Dzieci powyżej 6 lat i młodzież do 18 lat - 2 do 3 razy na dobę 5 ml miarką.
- Przy podawaniu dzieciom dawkę syropu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości słabej herbaty lub wody.
- Dorośli - 3 do 4 razy na dobę 15 ml miarką.
- Syrop stosować doustnie, około pół godziny przed posiłkiem. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.
- Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest wyciąg płynny (1:2) złożony z Achillea millefolium L. herba (ziele krwawnika), Marrubium vulgare L. herba (ziele szanty), Melissa officinalis L. folium (liść melisy) i Foeniculum vulgare Mill. fructus (owoc kopru włoskiego) (3/2/3/2) - 15 g na 100 g produktu leczniczego, ekstrahent: woda oczyszczona.

Substancje pomocnicze to: sacharoza, woda oczyszczona, koncentrat pomarańczowy 2578 (naturalny sok z pomarańczy, woda),

benzoesan sodu (E 211).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego,
- Uczulenie na rośliny z rodziny astrowate/ złożone (Asteraceae/Compositae) np. rumianek, nagietek.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania produktu leczniczego Apetiherb mogą wystąpić: zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (alergiczne reakcje skórne) – częstość nieznana; zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (alergiczne reakcje ze strony układu oddechowego) - częstość nieznana.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25° C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- 15 ml leku Apetiherb zawiera ok.12 g sacharozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Dzieci i młodzież: nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.
- Lek Apetiherb a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji produktu Apetiherb z innymi lekami.
- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Z uwagi na brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży i

karmienia piersią nie należy stosować produktu w tym okresie. Wpływ na płodność nie jest znany.

- Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.