


ArmoLipid, 60 tabletek



Cena: 75,90 zł

Opis słownikowy

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena jednostkowa | 60 szt |
| Opakowanie | 60 tabletek |
| Postać | tabletki |
| Producent | MYLAN EPD |
| Rejestracja | Suplement diety |

Opis produktu

Opis

ArmoLipid, suplement diety w postaci tabletek, zawierający w swoim składzie polikosanol, czerwony fermentowany ryż, kwas foliowy, koenzym Q10 i bogatą astaksantynę oleożywicę z alg *Haematococcus pluvialis*. ArmoLipid przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu uzupełnienia diety mającej na celu kontrolę cholesterolu u osób dorosłych. Kwas foliowy pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny. Produkt bezglutenowy.

Zastosowanie

Uzupełnienie diety mającej na celu kontrolę cholesterolu u osób dorosłych.

Zalecane spożycie

- 1 tabletkę dziennie.
- Tabletkę można podzielić na dwie części, w przypadku trudności z połknięciem, a następnie połknąć popijając szklanką wody.

Skład

Stabilizatory: węgiel wapnia, celuloza mikrokrystaliczna; Czerwony fermentowany ryż (*Monascus purpureus*) - zawartość monakolin 1,75%; Bogata w astaksantynę oleożywica z alg *Haematococcus pluvialis*; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; Polikosanol; Koenzym Q10; Kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy).

Każda tabletkę zawiera czerwony fermentowany ryż 160 mg (co odpowiada 2,8 mg monakolin), Bogata w astaksantynę oleożywica z alg *Haematococcus pluvialis* 20 mg co odpowiada zawartości astaksantyny 0,5 mg, Polikosanol 10 mg, kwas foliowy 200 µg*, Koenzym Q10 2 mg

* co odpowiada 100% Referencyjnej Wartości Spożycia dla kwasu foliowego.

Przechowywanie

- W suchym miejscu.
- W miejscu niewidocznym i w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy spożywać monakolin pochodzących z czerwonego fermentowanego ryżu w dziennej dawce 3 mg i większej.
- Zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania.
- Nie stosować w ciąży, w okresie karmienia piersią, u niemowląt, dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.
- Nie spożywać, jeśli przyjmowane są leki obniżające poziom cholesterolu, ani jeśli spożywane są inne produkty zawierające czerwony fermentowany ryż.
- Należy zasięgnąć porady lekarza dotyczącej spożywania tego produktu, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

Dodatkowe informacje

- Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
- Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.