

## Asmag B6 20 mg + 0,25 mg, 50 tabletek



Cena: 12,99 zł

### Opis słownikowy

Dawka	20 mg + 0,25 mg
Opakowanie	50 tabletek
Producent	ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY "FARMAPOL" SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Magnesii hydroaspartas, Pyridoxini hydrochloridum

### Opis produktu

#### Opis

Asmag B6, lek zawierający magnez i witaminę B6. Niedobór magnezu osłabia odporność organizmu, prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu nerwowego, mięśni i tkanki kostnej oraz przyspiesza rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych.

#### Wskazania

Uzupełnianie niedoboru magnezu w organizmie.

#### Działanie

- Witamina B6 zwiększa wchłanianie magnezu oraz zmniejsza jego wydalanie z moczem.
- Magnez wywiera ochronny wpływ na mięsień sercowy, bierze udział w rozwoju i mineralizacji kości, jest niezbędny do syntezy niektórych hormonów, np. insuliny, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom i stanom zapalnym.

#### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: doustnie, 3 tabletki 4 razy na dobę.
- Dzieci: doustnie, 1 tabletką 2 do 3 razy na dobę.

Asmag B6 należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

#### Skład

Substancjami czynnymi leku są: magnezu wodorasparaginian czterowodny oraz pirydoksyny chlorowodorek.

1 tabletką zawiera: 20 mg jonów magnezu w postaci 300 mg magnezu wodorasparaginianu czterowodnego oraz 0,25 mg pirydoksyny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, dekstryna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), metyloceluloza.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku;
- Ciężka niewydolność nerek;
- Zwiększone stężenie magnezu we krwi;
- Zaburzenia pracy serca (uczucie zbyt wolnego, szybkiego lub nierównego bicia serca);
- Choroba zwana myasthenia gravis (rzadka choroba objawiająca się nadmiernym osłabieniem mięśni);
- Biegunka;
- Jeśli pacjent jest leczony antybiotykami.

### Działania niepożądane

Zastosowanie większej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak: nudności, wymioty, biegunka.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.