

# AulinDol 30 mg/g, żel, 100 g



Cena: 31,00 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	30 mg/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Nimesulidum

## Opis produktu

### Opis

Lek AulinDol zawiera substancję czynną nimesulid, należącą do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym.

### Wskazania

Objawowe leczenie bólu związanego ze skręceniami stawów oraz z ostrym urazowym zapaleniem ścięgien.

### Działanie

- Przeciwzapalne.
- Przeciwbólowe.

### Dawkowanie

Cienką warstwę żelu (zazwyczaj w dawce 3 g, co odpowiada 6 - 7 cm wyciśniętego żelu) nałożyć na bolesne miejsce 2 - 3 razy na dobę i wetrzeć do całkowitego wchłonięcia.

### Skład

1 g żelu zawiera 30 mg nimesulidu (Nimesulidum).

Substancją czynną leku jest nimesulid.

Pozostałe składniki to: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogolglycerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanolamina i woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocnicze.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
- Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub skurcz oskrzeli) po zastosowaniu

kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

- Skóra pęknięta, otarta, zakażenie skóry.
- Nie stosować jednocześnie z innymi kremami o miejscowym działaniu.

#### Działania niepożądane

- Przerwać stosowanie leku AulinDol i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna: objawy reakcji alergicznej obejmują obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła bądź też trudności z oddychaniem.
- Przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z wymienionych działań niepożądanych: świąd, zaczerwienienie skóry lub wysypka (te działania niepożądane występują często, u mniej niż 1 na 10 osób).

#### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu: 14 dni.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.