

# Aviorexan, lek na chorobę lokomocyjną, 50mg+50mg, 10 tabletek



Cena: 21,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	50 mg, 50 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dimenhydrinatum, Coffeinum
Wiek	od 12 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Aviorexan jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: dimenhydraminę i kofeinę. Stosowany w zapobieganiu i leczeniu objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

### Wskazania

Zapobieganie i leczenie objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej, w tym:

- nudności,
- wymioty,
- zawroty głowy.

### Działanie

Aviorexan jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne: dimenhydraminę i kofeinę.

- Dimenhydramina- należy do grupy leków przeciwhistaminowych.
- Kofeina- działa pobudzająco na układ nerwowy.

Obie substancje wpływają na zmniejszenie objawów w przebiegu choroby lokomocyjnej. Kofeina łagodzi działanie uspokajające dimenhydraminy.

### Dawkowanie

- Zalecana dawka wynosi 1-2 tabletki.
- W razie konieczności dawkę można powtórzyć po 4-6 godzinach.

- Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
- W profilaktyce objawów choroby lokomocyjnej pierwszą dawkę należy zażyć nie później niż 30 minut przed planowaną podróżą.

#### Skład

Substancją czynną leku są dimenhydramina i kofeina, każda tabletką powlekana zawiera 50 mg dimenhydraminy (Dimenhydrinatum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum).

Pozostałe składniki: Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon Typ A, powidon K 29/32, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk.

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Porfiria.
- Ostry atak astmy.
- Ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe.
- Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.
- Bezsenność i stany lękowe.
- Padaczka.
- Wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy.
- Ciężkie zaburzenia wątroby.
- Jaskra z wąskim kątem przesączania.
- Guz chromochłonny nadnerczy.

#### Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

- Początek działania występuje po 15 – 30 minutach.
- Efekty lecznicze obserwowane są przez 3 do 6 godzin po podaniu leku.