

Azel-Drop Alergia, krople do oczu, 6 ml



Cena: 38,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	6 ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Azelastinum
Wiek	od 4 roku życia

Opis produktu

Opis

Azel-Drop Alergia zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwalergicznym i przeciwhistaminowym. Lek powoduje szybkie ustąpienie objawów, takich jak pieczenie, świąd, łzawienie, bez wywoływania objawów senności. Lek hamuje działanie histaminy i innych substancji zapalnych wydzielanych w większej ilości u osób z alergią. W ten sposób lek przeciwdziała objawom zapalenia spojówek. Azel-Drop Alergia należy stosować do leczenia sezonowych zaburzeń alergicznych u dzieci w wieku od 4 lat i do leczenia niesezonowych (całorocznych) zaburzeń alergicznych u młodzieży w wieku od 12 lat.

Wskazania

- Leczenie lub zapobieganie objawom sezonowych, alergicznych zaburzeń ocznych (sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek towarzyszące katarowi

siennemu) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.

- Leczenie objawów niesezonowych (całorocznych) alergicznych zaburzeń ocznych (całorocznego, alergicznego zapalenia spojówek) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Działanie

Przeciwalergiczne i przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

- Sezonowe, alergiczne zapalenie spojówek: jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci powyżej 4 lat to jedna kropla do każdego oka 2 razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie. Lek można podać profilaktycznie przed przewidywanym narażeniem na alergen.
- Niesezonowe (całoroczne), alergiczne zapalenie spojówek: jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka u

dorosłych i młodzieży w wieku od 12

lat to jedna kropla do każdego oka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć do jednej kropli, podawanej 4 razy dziennie.

Należy kontynuować stosowanie leku Azel-Drop Alergia po ustąpieniu objawów tak długo, ile trwa narażenie na substancje uczulające (np. pyłki, kurz).

Leku nie należy stosować dłużej niż 6 tygodni.

Skład

Substancją czynną jest azelastyny chlorowodorek.

1 ml zawiera 0,5 mg azelastyny chlorowodoru. Jedna kropla zawiera 0,015 mg azelastyny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek; sorbitol ciekły 70%, (niekryształizujący); hypromeloza; disodu edetynian; sodu wodorotlenek (do ustalenia pH); woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Uczulenie na azelastyny chlorowodorek, benzalkoniowy chlorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Często: (mogą dotyczyć 1 na 10 osób): łagodne, przemijające podrażnienie (np. pieczenie, swędzenie, łzawienie) oka występowało po podaniu tego leku.
- Niezbyt często: (mogą dotyczyć 1 na 100 osób): gorzki smak w ustach.
- Bardzo rzadkie: (mogą dotyczyć 1 na 10 000 osób): reakcje alergiczne (takie jak wysypka i świąd).

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
- Nie stosować leku po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azel-Drop Alergia należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

- jeśli pacjent nie jest pewien, czy zaburzenie oka jest wynikiem alergii. W szczególności dotyczy to takich sytuacji, gdy problem dotyczy tylko jednego oka; występuje pogorszenie widzenia, ból oka, lecz nie występują żadne objawy dotyczące nosa. Może to oznaczać, że przyczyną jest zakażenie, a nie alergia
- jeśli objawy nasiliły się lub będą się utrzymywać przez okres dłuższy niż 48 godzin bez istotnej poprawy, mimo zastosowania tego leku.

Osoby z zapaleniem spojówek nie powinny nosić soczewek kontaktowych.

- Nie jest znany wpływ innych leków, jedzenia, bądź picia na ten lek.
- W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lek przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Z tego powodu nie zaleca się stosowania tego leku w okresie karmienia piersią.
- Może występować łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku. Jest mało prawdopodobne, aby ten lek znacznie zaburzał widzenie. W razie wystąpienia jakiegokolwiek przemijającego zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, do momentu powrotu prawidłowej ostrości wzroku.
- Ten lek zawiera 0,0035 mg chlorku benzalkoniowego w każdej kropli, co odpowiada stężeniu 0,125 mg/ml. Chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe i zmieniać ich zabarwienie. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, zwłaszcza u osób z zespołem suchego oka lub zaburzeniami dotyczącymi rogówki (przezroczystej warstwy z przodu oka). W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.