

Azelastin Comod, krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml, 10 ml



Cena: 44,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Azelastinum

Opis produktu

Wskazania

Lek stosowany w celu:

- leczenia i zapobiegania dolegliwościom oczu spowodowanym przez katar sienny (alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.
- leczenia dolegliwości oczu

spowodowanych przez alergię na substancje, takie jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i powyżej.

Działanie

Przeciwhistaminowe, które polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm podczas reakcji alergicznej. Azelastyna łagodzi stan zapalny oczu.

Dawkowanie

- Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek): jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej należy zakraplać po jednej kropli leku do każdego oka, 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli 4 razy na dobę.
- Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezonowe zapalenie spojówek): jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej podaje się

po jednej kropli do każdego oka, dwa razy na dobę. Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli cztery razy na dobę.

- Nie stosować leku dłużej niż 6 tygodni.

- Lek należy stosować wyłącznie do oczu.

Skład

- Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50 mg/ml.

Jedna kropla leku o objętości około 30 µl zawiera 0,015 mg chlorowodoru azelastyny.

- Inne składniki leku to: disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Stwierdzone uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- Zaburzenia układu immunologicznego: bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów): reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie).
- Zaburzenia układu nerwowego: niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów): gorzki smak w ustach.
- Zaburzenia oka: często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): łagodne, przejściowe podrażnienie oczu.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek nie nadaje się do leczenia zakażeń oczu.
- Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą: - jeżeli pacjent nie jest pewien, czy odczuwane dolegliwości oka są spowodowane alergią. W szczególności, jeżeli dolegliwości obejmują tylko jedno oko, występuje upośledzenie wzroku lub bolesność oka, i pacjent nie odczuwa dolegliwości ze strony nosa, to jest to raczej zakażenie oka, a nie alergja. - jeżeli dolegliwości nasilają się lub trwają ponad 48 godzin bez wyraźnej poprawy pomimo

stosowania tego leku.

- Należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed zastosowaniem tego leku: jeżeli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek inne leki dostępne bez recepty, jeżeli pacjent stosuje twarde soczewki kontaktowe.
- Dotychczas nie są znane interakcje między tym lekiem a innymi lekami lub pożywieniem.
- Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka, dlatego nie należy stosować go w czasie karmienia piersią.
- Jest mało prawdopodobne, żeby łagodne, przemijające podrażnienie oczu wywołane zakropleniem leku mogło w istotny sposób zaburzać widzenie. Jednakże u pacjentów odczuwających jakiegokolwiek przemijające zaburzenia widzenia może wystąpić nieostre widzenie przez krótki czas po zakropleniu leku. Należy odczekać do ustąpienia objawów przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.