

Bebiko Extracare Comfort, żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia w przypadku kolek lub zaparć, 350 g



Cena: 39,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	350 g
Postać	proszek
Producent	NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Diet. środ. specjal. przezn. med.
Wiek	od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Bebiko Extracare Comfort, żywność specjalnego przeznaczenia dla niemowląt od urodzenia w przypadku kolek lub zaparć. Łagodzi dolegliwości trawienne małego brzuszka dzięki dodatkowi unikalnej kompozycji błonnika GOS/ FOS 9:1, beta-palmitynianu, częściowo zhydrolizowanego białka oraz obniżonemu poziomowi laktozy.

Odpowiednio opracowany skład sprawia, że produkt ten jest lekkostrawne i dobrze tolerowane.

Zastosowanie

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt do postępowania dietetycznego w przypadku kolek lub zaparć.

Zalecane spożycie

- Wiek niemowlęcia 1. miesiąc: liczba porcji na dobę: 7, woda 90-120 ml, liczba płaskich miareczek na porcję: 3-4.
- Wiek niemowlęcia 2.-3. miesiąc: liczba porcji na dobę: 6, woda 120 ml, liczba płaskich miareczek na porcję: 4.
- Wiek niemowlęcia 4. miesiąc: liczba porcji na dobę: 6, woda 150 ml, liczba płaskich miareczek na porcję: 5.
- Wiek niemowlęcia 5.-6. miesiąc, liczba porcji na dobę: 4, woda 180 ml, liczba płaskich miareczek na porcję: 6.
- Wiek niemowlęcia 7. miesiąc i powyżej: liczba porcji na dobę: 3, woda 210 ml, liczba płaskich miareczek na porcję: 7.
- 100 ml = 90 ml wody + 3 płaskie miareczki = 277 kJ (66 kcal). 1 płaska miareczka = 4,6 g = 92 kJ (22 kcal).

Sposób przygotowania produktu

1. Umyj ręce, wyparz miareczkę oraz wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut lub użyj sterylizatora.
2. Gotuj wodę pitną przez 5 minut i pozostaw do wystygnięcia do temperatury ok. 40°C.
3. Sprawdź tabelę żywienia i wlej dokładną ilość wody do butelki.
4. Zawsze używaj wyłącznie załączonej miareczki.

5. Dodaj dokładną liczbę płaskich, nieubitych miareczek Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare.
6. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż smoczek na butelkę.
7. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.

Skład

Hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek choliny, olej z *Mortierella alpina*, magnez, sól, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Wartości odżywcze

Wartość energetyczna
Wartość energetyczna
Tłuszcz w tym
kwasy tłuszczowe nasycone
kwasy tłuszczowe jednonienasycone

kwasy tłuszczowe wielonienasycone

kwas α -linolenowy (ALA)

kwas arachidonowy (ARA)

kwas dokozaheksaenowy (DHA)

kwas eikozapetaenowy (EPA)

Węglowodany w tym

cukry

laktoza

Błonnik w tym

GOS*

FOS**

Białko***

L-karnityna

Sól

Witaminy

Witamina A

Witamina D

Witamina E

Witamina K

Witamina C

Tiamina

Ryboflawina

Niacyna

Witamina B6

Kwas foliowy

Witamina B12

Biotyna

Kwas pantotenowy

Składniki mineralne

Sód

Potas

Chlorek

Wapń

Fosfor

Magnez

Żelazo

Cynk

Miedź

Mangan

Fluorek

Selen

Chrom

Molibden

Jod

Inne

Tauryna

Cholina

Pozostałe GOS*

* Galaktooligosacharydy

** Fruktooligosacharydy

*** Hydrolizowane białko serwatkowe mleka krowiego

Jedno opakowanie pozwala na przygotowanie około 25 butelek produktu o pojemności 100 ml.

Przechowywanie

- Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.
- Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
- Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
- Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce.
- Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu 1 miesiąca.

Dodatkowe informacje

- Nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
- Produkt przeznaczony do postępowania dietetycznego w przypadku kolek lub zaparć i należy je stosować pod nadzorem lekarza. Można podawać niemowlęciu, gdy dokuczają mu kolki lub zaparcia już od pierwszych chwil życia jako jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe. Następnie zgodnie ze schematem żywienia należy rozpocząć rozszerzanie diety o żywność uzupełniającą. Zaleca się, aby produkt ten był stosowany przynajmniej 7 dni, bez zmiany na inny produkt. Produkt może również służyć do przygotowywania kleików i bezmlecznych kaszek BoboVita na odpowiednim etapie rozszerzania diety niemowlęcia. Decyzja o rozpoczęciu rozszerzania diety powinna być skonsultowana z lekarzem.
- Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.
- Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

