

# Benzydamine neo-angin forte, aerozol, 15 ml



Cena: 21,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	15 ml
Dawka	3 mg/ml
Opakowanie	15 ml
Postać	aerozol do gardła
Producent	M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

## Opis produktu

### Wskazania

Do stosowania u dorosłych w objawowym miejscowym leczeniu ostrego bólu gardła z towarzyszącymi typowymi objawami stanu zapalnego, takimi jak ból, zaczerwienienie lub obrzęk w jamie ustnej i gardle.

### Działanie

Przeciwbólowo i przeciwobrzękowo (przeciwzapalnie).

### Dawkowanie

- Lek ten jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej i gardle.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.
- Tego leku nie należy stosować bezpośrednio przed jedzeniem lub pić.
- Lek stosuje się na ogół od 2 do 6 razy na dobę (nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny): od 2 do 4 dawek na podanie.

### Skład

Substancją czynną leku jest benzydaminu chlorowodorek.

1 ml aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodoru.

Pojedyncza dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 0,51 mg benzydaminu chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: Glicerol 85%, Etanol 96%, Makroglicerolu hydroksystearynian, Metylu parahydroksybenzoesan (E 218), Sacharyna sodowa (E 954), Sodu wodorowęglan (do ustalenia pH), Aromat wiśniowy, Woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek benzydaminu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

- Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób): nadwrażliwość na światło (skóra staje się bardziej niż zwykle wrażliwa na światło słoneczne, co

wywołuje swędzącą, czerwoną, łuskowatą wysypkę, niekiedy z pęcherzami).

- Rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 osób): swędzenie i suchość w ustach; znieczulenie ust i gardła (należy do zakresu działania tego leku i szybko ustępuje); nudności; wymioty.
- Bardzo rzadko (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 osób): Trudności z oddychaniem lub potykaniem (skurcz krtani lub skurcz oskrzeli); Bolesny obrzęk podskórny błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy).
- Częstość nieznana

-Reakcje alergiczne (nadwrażliwość)

-Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Ciężka reakcja alergiczna (szok anafilaktyczny), której objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej lub uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wypukłe guzki na skórze, obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła i która może potencjalnie zagrażać życiu.

### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu produktu leczniczego nie należy używać dłużej niż przez 4 tygodnie.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Benzydamine neo-angin forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma uczulenie na salicylany (np. kwas acetylosalicylowy i kwas salicylowy) lub inne leki o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym (tzw. NLPZ);
- jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występowała astma oskrzelowa lub choroby alergiczne, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli lub alergii.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym. Owrzodzenie jamy ustnej i gardła może okazać się objawem znacznie cięższych chorób.

Jeśli po upływie 3 dni objawy nie ustąpiły lub pacjent czuje się gorzej, jeśli pacjent ma gorączkę lub inne objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie leku może mieć szkodliwy wpływ na florę bakteryjną jamy ustnej i może powodować podrażnienia. W takim wypadku konieczne będzie tymczasowe przerwanie stosowania i zasięgnięcie porady lekarza.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni.

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

- Lek Benzydamine neo-angin forte a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych/stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować/stosować.
- Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku tego nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek Benzydamine neo-angin forte zawiera 13,22 mg alkoholu (etanolu) w każdej jednostce dawkowania- jedno rozpylenie odpowiadające 0,17 ml. Ilość alkoholu w jednej dawce tego leku jest równoważna mniej niż 0,5 ml piwa lub wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
- Lek ten zawiera metylu parahydroksybenzoesan: lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego) i wyjątkowo skurcz oskrzeli.
- Lek ten zawiera makroglicerolu hydroksystearynian (otrzymywany z oleju rycynowego): lek może powodować niestrawność i biegunkę.
- Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w każdej jednostce dawkowania, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.