

Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, 30 ml



Cena: 33,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	0,02 g
Opakowanie	30 ml
Postać	krople doustne
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Simeticonum
Wiek	od 28 dnia życia

Opis produktu

Opis

Bobotic Forte, krople doustne od 28 dnia życia, zawierają symetykon, który skutecznie obniża napięcie powierzchniowe ścian pęcherzyków gazu znajdujących się w jelitach, ułatwia ich łączenie i pękanie. Usprawnia to wydalanie gazów i zmniejsza napięcie jelit, które jest przyczyną bólu. Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest całkowicie wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Zastosowanie

- U niemowląt od 28 dnia życia i dzieci do 12 lat w celu łagodzenia objawów, takich, jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego.
- Pomocniczo w przygotowaniu niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wzniernikowanie żołądka i dwunastnicy.

Zalecane spożycie

- Przed użyciem należy wstrząsnąć buteleczką do uzyskania jednolitego płynu.
- Butelka wyposażona jest w kroplomierz, za pomocą którego należy odliczyć zalecaną ilość kropli, które można podać do buzi dziecka przy pomocy dołączonej do opakowania łyżeczki lub nakroplic na smoczek przed podaniem go dziecku. Odmierzoną ilość płynu można wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, stosowanej odżywką (mleka) lub innego niegazowanego płynu.
- W celu łagodzenia objawów, takich jak kolka, wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie, niestrawność, związanych z nagromadzeniem gazu w obrębie przewodu pokarmowego: niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy stosować więcej niż 18 kropli na dobę (120 mg symetykonu). Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6

kropli (40 mg symetykonu) przed, w trakcie lub po każdym posiłku. Nie należy stosować więcej niż 36 kropli na dobę (240 mg symetykonu).

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

- W dniu poprzedzającym badania należy przyjąć: Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu) 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę.
- Rano w dniu badania, na czczo, należy przyjąć: Niemowlęta i dzieci w wieku poniżej 2 lat: 3 krople (20 mg symetykonu). Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 6 kropli (40 mg symetykonu).

Wyrób medyczny bez konsultacji z lekarzem można stosować do 4 tygodni.

Skład

Symetykon, sodu benzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, guma ksantanowa, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Przechowywanie

W suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu, w temperaturze poniżej 25 .

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.
- Nie podawać noworodkom (tzn. do 28 dnia życia).
- Podczas stosowania wyrobu nie należy pić napojów gazowanych.
- W przypadku występowania u dziecka długotrwałych i niewyjaśnionych dolegliwości brzusznych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

- Wyrób medyczny nie zawiera cukru i może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.