

Bronchostop Duo na kaszel, syrop, 200 ml



Cena: 23,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	(120 mg + 830 mg) / 15 ml
Opakowanie	200 ml
Postać	syrop
Producent	KWIZDA PHARMA GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Thymi herbae extractum siccum, Althaeae radice extractum fluidum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany do pobudzania odrzuktuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem oraz do uśmierzenia podrażnienia gardła i związanego z tym suchego kaszlu.

Działanie

Ułatwia odkasztnianie, uśmierza suchy kaszel.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 15 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobową to 90 ml.
- Dzieci 6 – 12 lat: 7,5 ml co 3 do 4 godzin, 4 razy na dobę. W razie konieczności maksymalnie 6 razy na dobę, przy czym maksymalna dawka dobową to 45 ml.
- Podawać doustnie. W razie konieczności lek można podawać rozcieńczony w wodzie lub ciepłej herbacie. Czas samodzielnego podawania leku należy ograniczyć do 7

dni. Jeżeli do tego czasu nie nastąpi istotna poprawa, zaleca się konsultację u lekarza, ponieważ pacjent może chorować na bardziej poważne schorzenie.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: wyciąg suchy z *Thymus vulgaris* L. i/ lub *Thymus zygis* L, herba, (ziele tymianku) (7-13:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda. Wyciąg z *Althaea officinalis* L., radix (korzeń prawoślazu) (1:12-14). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

Pozostałe składniki to: ksylitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, koncentrat soku malinowego, aromat malinowy, guma ksantanowa, kwas cytrynowy jednowodny (E 330), maltodekstryna, guma arabska, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na tymianek, korzeń prawoślazu lub inne rośliny należące do rodziny Lamiaceae albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: zaobserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości (w tym jeden przypadek wstrząsu anafilaktycznego i jeden przypadek obrzęku Quinckiego) i objawów ze strony żołądka w czasie stosowania produktów leczniczych zawierających tymianek.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie u dzieci w wieku do 3 lat nie jest zalecane.
- W przypadku wystąpienia gorączki, duszności lub ropnej wydzieliny należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.