

Bronchostop na kaszel, 20 pastylek miękkih



Cena: 19,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	59,5 mg
Opakowanie	20 pastylek miękkih
Postać	pastylki miękkie
Producent	KWIZDA PHARMA GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Thymi herbae extractum siccum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Pobudzanie odkrztuszania zalegającego, gęstego śluzu w przypadku kaszlu związanego z przeziębieniem.

Działanie

Pobudzanie odkrztuszania zalegającego.

Dawkowanie

- Dzieci i młodzież powyżej 12 lat: 1 - 2 pastylki, co 4 godziny, 4 razy dziennie. W razie konieczności można przyjąć maksymalnie 12 pastylek dziennie.
- Dzieci 6 - 12 lat: 1 pastylka, 3 razy dziennie.
- Ssać i powoli rozpuszczać w jamie ustnej.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

- Substancją czynną jest suchy ekstrakt z ziela tymianku *Thymus Vulgaris* L. i/lub *Thymus zygis* L., (7-13:1), ekstrahent: woda
- Pozostałe składniki to: guma arabska, guma arabska suszona rozpyłowo (E 414), fruktoza, sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), maltodekstryna, kwas cytrynowy bezwodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), aromat aroniowy, aromat owoców leśnych, parafina ciekła lekka, wosk biały (E 901), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na tymianek, inne rośliny należące do rodziny Lamiaceae (Lamiaceae dawniej Labiatae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Częstość nieznana: zaobserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości (w tym jeden przypadek wstrząsu anafilaktycznego i jeden

przypadek obrzęku Quinckego) i objawów ze strony żołądka w czasie stosowania produktów leczniczych zawierających tymianek.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią.
- Nie jest zalecane stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Pacjent z nietolerancją na niektóre cukry przed użyciem leku powinien skonsultować się z lekarzem.
- 1 pastylka odpowiada około 0,1 jednostki węglowodanowej. Należy to uwzględnić u pacjentów chorych na cukrzycę.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.