

## Buscopan Forte 20 mg, 10 tabletek powlekanych



Cena: 21,90 zł

### Opis słownikowy

Dawka	20 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	BOEHRINGER INGELHEIM INTERN.GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hyoscine

### Opis produktu

**Opis**  
Buscopan Forte, lek w postaci tabletek powlekanych. Substancja czynna Hioscyny butylobromek jest środkiem rozkurczowym.

### Wskazania

Stany skurczowe:

- Mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), i dyskinezya dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa),
- W obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicią moczowodową).

### Działanie

- Przeciwbólowe.
- Rozkurczowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat to 1 do 5 razy na dobę po 1 tabletkę powlekaną.
- Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.
- Nie należy stosować leku Buscopan Forte dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.

### Skład

1 tabletkę powlekaną zawiera: 20 mg hioscyny butylobromku.

Substancje pomocnicze: powidon K25, laktoza jednowodna, celuloza mikrokystaliczna, laktoza jednowodna (do tabletkowania bezpośredniego), magnezu stearynian. Otoczka: opadry II white 85G18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek, lecytyna, makrogol).

### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na hioscynybutylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Nużliwość mięśni (myastheniagravis).
- Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).
- Rzadkie zaburzenia dziedziczne, które mogą uniemożliwić przyjmowanie zawartej w nim substancji pomocniczej.
- Nietolerancja niektórych cukrów, ponieważ produkt zawiera laktozę.

### Działania niepożądane

- Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Są one zwykle łagodne i przemijające.

Zanotowano także następujące działania niepożądane:

- Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): szybkie bicie serca, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, świąd).
- Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów): zatrzymanie moczu.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwrażliwości.

### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.