


Calcium Hasco 115,6 mg/ 5 ml, syrop o smak bananowym, 150 ml



Cena: 13,90 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|---|
| Dawka | 115,6 mg jonów Ca/5ml |
| Opakowanie | 150 ml |
| Postać | syrop |
| Producent | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Calcii glubionate, Calcii lactobionas |

Opis produktu

Wskazania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.

Działanie

Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Dawkowanie

- Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.
- Dzieci: do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę; od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Skład

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu. Inne składniki leku to sacharoza, sodu benzoatan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat bananowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku,
- Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy

przedawkowaniu witaminy D),

- Zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria),
- Ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

Działania niepożądane

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Przechowywanie

- W zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.
- Ciąża i okres karmienia piersią: przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.