

Calcium Sandoz Forte, 20 tabletek musujących



Cena: 22,95 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg Ca ²⁺
Opakowanie	20 tabletek musujących
Postać	tabletki musujące
Producent	SANDOZ GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Calcii carbonas, Calcii glubionate

Opis produktu

Opis

Calcium Sandoz Forte, lek w postaci tabletek musujących, będący zawierający wapń, będący podstawowym składnikiem mineralnym, niezbędnym do budowania i prawidłowego funkcjonowania kości.

Wskazania

- Zapobieganie niedoborom wapnia i ich leczenie.
- W krzywicy i osteomalacji jako uzupełnienie terapii witaminą D3.
- Wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy.

Działanie

Wapń:

- Pełni ważną rolę w funkcjonowaniu narządów.
- Jest niezbędny w procesach sprawnego działania nerwów, mięśni i serca, a także prawidłowego krzepnięcia krwi.
- Pośredniczy w prawidłowym działaniu hormonów.

Dawkowanie

- Dzieci: 1 tabletkę musującą (jedna dawka) raz lub dwa razy na dobę (co odpowiada 500-1000 mg wapnia).
- Dorośli: 1 tabletkę musującą (jedna dawka) raz, dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 500- 1500 mg wapnia).
- Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody (około 200 ml) i wypić bezpośrednio po rozpuszczeniu. Tabletki nie należy połykać ani żuć.
- Lek Calcium-Sandoz Forte można przyjmować z posiłkiem lub między posiłkami.

Skład

- 1 tabletkę 500 mg zawiera: 1132 mg wapnia laktogluconianu i 875 mg wapnia węglanu (co odpowiada 500 mg wapnia).
- Inne składniki: kwas cytrynowy bezwodny, aromat pomarańczowy (zawiera: olejek pomarańczowy, maltodekstrynę, gumę arabską, sorbitol (B420), dekstrozę), aspartam (E951), makrogol 6000 i sodu wodorowęglan.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Choroby/schorzenia powodujące hiperkalcemię i (lub) zwiększenie wydalania wapnia z moczem.
- Zwapnienie nerek.
- Kamica nerkowa.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób): ciężkie reakcje alergiczne, takie jak: obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, co może

powodować trudności w przełykaniu.

- Rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 1000 osób): nudności, biegunka, bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia, wymioty, świąd, zaczerwienienie i

(lub) pieczenie skóry.

- Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 osób): zwiększona zawartość wapnia we krwi (hiperkalcemia) lub zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.