

Calominal Duo, na nadwagę, proszek, 150 g



Cena: 64,90 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	150 g
Opakowanie	150 g
Postać	proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Calominal Duo, wyrób medyczny, którego składniki posiadają zdolność do wiązania lipidów i węglowodanów. Stosowanie Calominal Duo powinno być połączone z aktywnością fizyczną oraz ze zdrowym odżywianiem. Składniki preparatu wspomagają redukcję i kontrolę masy ciała oraz zwiększają uczucie sytości i ograniczają ilość przyswajanego z pożywienia cholesterolu.

Zastosowanie

- Wspomaga leczenie nadwagi.
- Zmniejsza ilość tłuszczów i cukrów wchłanianych z pożywienia oraz ilość kalorii dostarczanych do organizmu.

Zalecane spożycie

- W celu redukcji masy ciała: 2 dawki 2 razy dziennie.
- W celu kontroli wagi: 1 dawkę 2 razy dziennie.

Skład

Glukomannan, chitozan, kwas cytrynowy, aromat multitropic, maltodekstryna DE 20, acesulfam K, sukraloza, betakaroten, sacharynian sodu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Osoby, u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz osoby przyjmujące leki ograniczające perystaltykę jelit powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo.
- Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza.
- Należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu Calominal duo.
- Osoby przyjmujące leki hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe) mogą zastosować Calominal duo tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Calominal duo nie jest zamiennikiem tych leków. Jeśli jakiegokolwiek

leki są przyjmowane długotrwale przed zastosowaniem wyrobu Calominal duo należy skonsultować się z lekarzem. Wyrób nie ma zdolności wiązania takich składników pożywienia jak białko czy alkohol.

- Nie stosować u dzieci i młodzieży.
- Nie przyjmować w okresie ciąży i karmienia piersią.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować u osób: ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) niższym niż 18,5, z dysfagią, z chorobami zapalnymi przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przetykowy, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie uchyłków), z objawami niedrożności jelit, z porażeniem żołądka, z polipami jelita, z ciężką niestrawnością, z zaparciami, po operacji obejścia lub zmniejszenia żołądka.
- W trakcie stosowania Calominalu duo nie należy przyjmować preparatów witaminy A.
- Nie stosować wyrobu Calominal duo jednocześnie z lekami lipofilowymi (np. doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami D, E i K, niektórymi antybiotykami).