

Canephron, 60 tabletek drażowanych



Cena: 49,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	18 mg + 18 mg + 18 mg
Opakowanie	60 tabletek drażowanych
Postać	tabletki drażowane
Producent	BIONORICA SE
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Levistici radix, Centaurii herba, Rosmarini folium

Opis produktu

Wskazania

Wspomagająco jako leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawczo w osadzaniu się piasku nerkowego.

Działanie

Wspomagające leczenie uzupełniające łagodnie przebiegających chorób zapalnych dróg moczowych oraz zapobiegawcze w osadzaniu się piasku nerkowego.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: po 2 tabletki drażowane 3 razy na dobę (całkowita dawka dobową wynosi 6 tabletek).
- Podanie doustne. Tabletki należy połykać w całości i popić niewielką ilością wody (np. szklanką wody).
- Podczas stosowania leku zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
- Lek może być stosowany przez okres do czterech tygodni (po trzech tygodniach należy skonsultować się z lekarzem).

Skład

Substancjami czynnymi leku są: 18 mg *Levisticum officinale* Koch, radix (korzeń lubczyka); 18 mg *Centaurium erythraea* Rafn s. l. włącznie z *C. majus* (H. et L.) Zeltner i *C. suffruticosum* (Griseb.) Ronn. (syn. *Erythraea centaurium* Persoon; *C. umbellatum* Gilibert; *C. minus* Gars.), herba (ziele centurii); 18 mg *Rosmarinus officinalis* L., folium (liść rozmarynu).

Inne składniki leku to: wapnia węglan, olej rycynowy pierwszego tłoczenia; dekstryna, barwniki: żelaza tlenek czerwony (E 172), ryboflawina (E 101), tytanu dwutlenek (E 171), glukoza ciekła (substancja sucha), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, wosk Montana glikolowy, powidon K 25, powidon K 30, szelak, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, talk.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub selera) lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych tego leku,
- Wrzody żołądka,
- W przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów

zostało zalecone przez lekarza.

Działania niepożądane

- Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia żołądkowo - jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka występują często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów).
- Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości/alergiczne: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
- Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku podczas ciąży. Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.
- W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. 1 tabletką drażowaną zawiera około 0,2 g łatwo przyswajalnych węglowodanów.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.