Apteka Namex
ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

Canesten, 1 kapsułka dopochwowa miękka i aplikator

Cena: 42,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 g
Opakowanie	1 kapsułka dopochwowa miękka
Postać	kapsułki dopochwowe miękkie
Producent	BAYER SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Clotrimazolum

Opis produktu

Opis
Canesten, lek do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat, którego substancją czynną jest klotrymazol, należący do grupy leków zwanych imidazolami. Jest skuteczny wobec drobnoustrojów takich, jak: dermatofity, drożdżaki i pleśnie.

Wskazania

Leczenie zakażeń pochwy i żeńskich zewnętrznych narządów płciowych wywołanych przez mikroorganizmy, takie jak grzyby (zazwyczaj Candida), wrażliwe na klotrymazol.

Działanie
Przeciwgrzybicze. Niszczy grzyby i hamuje ich wzrost.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat: 1 kapsułka dopochwowa, miękka, wprowadzona głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, wieczorem.

Skład

- Substancja czynna: klotrymazol.
- Pozostałe składniki: wypełnienie kapsułki: wazelina biała, parafina ciekła; otoczka kapsułki: żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), żółcień pomarańczowa (E110), lecytyna sojowa, trójglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na klotrymazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie należy stosować leku Canesten u dziewcząt w wieku poniżej 16 lat bez konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

- Często, częściej niż u 1 na 100 osób: pieczenie.
- Niezbyt często, częściej niż u 1 na 1000 osób: ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie.
- Rzadko, częściej niż u 1 na 10000 osób: reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy.
- Częstość nieznana, na podstawie dostępnych danych: złuszczanie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas stosowania leku Canesten należy unikać stosunków płciowych, ponieważ infekcja może być przeniesiona na partnera seksualnego.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Canesten należy omówić to z lekarzem: gdy do zakażeń pochwy doszło po raz pierwszy, gdy wystąpiły co najmniej 4 przypadki zakażeń w ciągu ostatniego roku, w przypadku gorączki 38°C lub wyższej, gdy pacjentka odczuwa ból w dolnej części brzucha, ból pleców, w przypadku cuchnących upławów, w przypadku nudności, gdy występuje krwawienie z pochwy i (lub) jednoczesny ból w ramionach.
- W trakcie stosowania leku Canesten nie należy stosować tamponów, płukania pochwy, środków plemnikobójczych lub innych produktów do stosowania dopochwowego.
- Nie należy stosować leku w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego leku przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.