

Capsagamma, krem rozgrzewający z kapsaicyną, 40 g



Cena: 21,59 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	40 g
Dawka	0,053 g/100g
Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	WORWAG PHARMA GMBH & CO.KG
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Capsici extractum spissum normatum

Opis produktu

Opis

Lek Capsagamma jest lekiem roślinnym zawierającym w swoim składzie wyciąg gęsty z owoców pieprzowca (Capsici extractum spissum normatum), stosowanym u dorosłych w łagodzeniu bóli mięśni. Kapsaicyna zwiększa termogenezę (wytwarzanie ciepła) i stymuluje metabolizm. Lokalnie zwiększa przepływ krwi z uczuciem ciepła. Krem o przyjemnym zapachu rozmarynu

Wskazania

Ból mięśni, np. w przypadku bólu lędźwiowo-krzyżowego.

Działanie

Kapsaicyna stosowana miejscowo powoduje aktywację receptorów bólu w skórze, podrażnienie i zwiększenie ukrwienia, czemu towarzyszy zaczerwienienie skóry i odczuwanie ciepła. W późniejszym etapie, wykazuje działanie przeciwbólowe.

Dawkowanie

Jeśli nie zalecono inaczej, u dorosłych i u osób w podeszłym wieku należy stosować krem 2-4 razy na dobę cienką warstwą na skórę w bolącym miejscu.

Leczenie należy kontynuować aż do uzyskania złagodzenia bólu, jeśli to niezbędne, do 3 tygodni. Po 3 tygodniach stosowania należy zrobić co najmniej 2 tygodniową przerwę w stosowaniu.

Skład

Substancją czynną leku jest standaryzowany wyciąg gęsty z owoców pieprzowca (Capsici extractum spissum normatum)

- 100 g kremu zawiera: 2,375 – 1,032 mg standaryzowanego wyciągu gęstego z Capsicum annum L. var. minimum (Miller) Heiser i Capsicum frutescens L, fructus (owoc pieprzowca) (DERpierzotny 2,8-4,9:1), co odpowiada 53 mg kapsaicynoidów, w przeliczeniu na kapsaicynę. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 80% (V/V).
- Pozostałe składniki leku to: Sorbitanu stearynian, makrogolu stearynian, glicerol 85%, triglicerydy kwasów tłuszczowych o

średniej długości łańcucha, tytanu dwutlenek, fenoksyetanol, karbomer 980, olejek eteryczny rozmarynowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona, glukoza ciekła.

Przeciwwskazania

- Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne kapsaicynoidy (np. papryka, chili).
- Nie stosować na uszkodzoną lub zranioną skórę ani na skórę z wypryskiem.
- Nie stosować u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Przechowywanie

- Lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące