

## Cataroft Free, krople do oczu bez konserwantów, 10 ml



Cena: 31,99 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Cataroft Free do krople do oczu bez konserwantów w formie izotonicznego roztworu, który jest wzbogacony o jodek potasu. Zawarty w składzie kropli jodek potasu działa w oku jako substancja wychwytyjąca wolne rodniki. Te właściwości jodu potasu wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu wspomagającym wysięków okulistycznych np. nagromadzonego płynu tkankowego i krwotoków w oku.

#### Zastosowanie

Bez konsultacji z lekarzem kropli można stosować w celu nawilżenia oczu. Krople mogą być stosowane pomocniczo do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania, a konkretnie wysięków, krwawień do ciała szklanego oraz zaćmy o różnej etiologii. Krople nie zawierają konserwantów co pozwala na zastosowanie kropli przez pacjentów z wrażliwymi oczami.

#### Sposób użycia

Konkretne dawkowanie i czas przez jaki należy stosować krople ustala indywidualnie lekarz. Zazwyczaj stosuje się 1-2 krople do worka spojówkowego do każdego oka od 2-4 razy dziennie.

Osoby stosujące soczewki kontaktowe powinny przed wkropleniem do oczu zdjąć soczewki. Po zakropleniu należy odczekać około 20 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

#### Skład

Chlorek sodu 2 mg/1 ml, jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, wodorotlenek sodu, woda wysokooczyszczona.

#### Przechowywanie

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu opakowania należy zużyć krople w przeciągu 12 tygodni tj. 3 miesięcy.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Bezpośrednio po zakropleniu produktu przez bardzo krótki czas możliwe jest niewyraźne widzenie, które może utrudnić

prowadzenie samochodu i obsługę maszyn. Z tego powodu zaleca się, aby nie wykonywać wyżej wymienionych czynności przed upływem 15 minut od aplikacji kropli.

- Niekontrolowane i długotrwałe stosowanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. "jodyzmu": podrażnienia i przekrwienia spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powieki (obrzęk Quinckego) i gruczołu łzowego. Mogą również wystąpić objawy skórne takie jak zaczerwienie, trądzik, zapalenie skóry i plamica.

#### Przeciwwskazania

Kropli Cataroft Free nie należy stosować w następujących przypadkach:

- ciąża lub karmienie piersią,
- przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy,
- skaza krwotoczna,
- u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy,
- u noworodków.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu i preparatów okulistycznych zaleca się zachować odstęp co najmniej 5 minut pomiędzy aplikacją każdego z preparatów.