

## Cataroft, krople do oczu, 10 ml

Cena: 25,19 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	10 ml
Postać	krople do oczu
Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Opis

Cataroft, krople do oczu, to nawilżający, izotoniczny roztwór do oczu z jodkiem potasu. Jodek potasu działa jako substancja wychwytyjąca wolne rodniki. Właściwości takie jodku potasu stosuje się w zapobieganiu i leczeniu podtrzymującym wysięków i krwotoków w oku oraz pomocniczo przy zaćmie o różnej etiologii. Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci.

#### Zastosowanie

- Nawilżanie powierzchni oka.
- Pomocniczo podczas niektórych procesów wchłaniania w szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii.

#### Sposób użycia

- Bezpośrednio do worka spojówkowego 1-2 krople do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie.
- Zastosowanie kropli może wpływać na działanie równocześnie podawanych preparatów okulistycznych. W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych, należy aplikować je nie wcześniej niż po 5 min od zastosowania kropli.
- Przed zastosowaniem kropli należy ściągnąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe można założyć po co najmniej 20 min od zakroplenia kropli.

#### Skład

Chlorek sodu (2 mg/ml), jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, dioctan chlorheksydyny, wodorotlenek sodu, wodę do iniekcji.

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.
- Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nadwrażliwość na składniki preparatu.
- Nie stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.
- Nie stosować jeżeli u pacjenta stwierdzono przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy, występuje skaza krwotoczna, u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy, u noworodków.
- Bezpośrednio po wkropleniu może pojawić się chwilowe, lekkie pieczenie lub kłucie. Niekontrolowane i długotrwałe podawanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. "jodyzmu", podrażnienia i przekrwienia spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powiek (obrzęk Quinckego) i gruczołu łzowego. W przypadkach tych mogą również wystąpić następujące objawy skórne: zaczerwienienie, trądzik, zapalenie skóry i plamica.

### Dodatkowe informacje

Bezpośrednio po zastosowaniu kropli może pojawić się krótkotrwałe nieostre widzenie. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn przez co najmniej 15 min od zastosowania kropli.