

# Cebion 100 mg/ ml, witamina C, krople doustne dla dzieci, 30 ml



Cena: 23,90 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	100 mg/ ml
Opakowanie	30 ml
Postać	krople doustne, roztwór
Producent	P&G Health Germany GmbH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Acidum ascorbicum
Wiek	od 1 miesiąca

## Opis produktu

### Opis

Cebion, krople doustne zawierają kwas askorbowy (witaminę C), substancję niezbędną dla człowieka. Witamina C uczestniczy w wielu reakcjach enzymatycznych (m.in. synteza kolagenu, synteza katecholamin, hydroksylacja steroidów, tyrozyny i substancji egzogennych), zwiększa wchłanianie soli żelaza, hamuje łańcuchowe reakcje wolnorodnikowe. Jej działanie antyoksydacyjne pozostaje w ścisłej zależności biochemicznej z antyoksydacyjnym działaniem witaminy E, witaminy A i karotenoidów.

### Wskazania

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C, w przypadkach gdy stosowanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

### Działanie

Zapobieganie i leczenie stanów niedoboru witaminy C.

### Dawkowanie

- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, dawkować wg poniższego schematu:
- Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 23 miesiąca życia): 5 – 8 kropli na dobę, najlepiej dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku

owocowego.

- Dzieci (od 24 miesiąca życia do końca 11 roku życia): 10 kropli na dobę,

- Młodzież (od 12 roku życia) i dorośli: 15-20 kropli na dobę.
- W razie większego zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę.

#### Skład

Substancja czynna: kwas askorbowy (witamina C).

Pozostały składnik: glicerol 87%.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na kwas askorbowy lub na którąkolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Choroba wrzodowa żołądka.
- Kamica nerkowa.
- Zaburzenia spichrzania żelaza (gromadzenia w organizmie).
- Stwierdzono zwiększone stężenie kwasu moczowego w wywiadzie.
- Ciąża i karmienie piersią - stosowanie po konsultacji z lekarzem.

#### Działania niepożądane

- W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej oraz ze strony układu oddechowego. Zwłaszcza przy stosowaniu dużych dawek obserwowano występowanie bólu głowy, zaburzeń żołądkowo-jelitowych (np. nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, niestrawność) oraz wielomocz.
- Długotrwałe stosowanie zwiększonych dawek może powodować kamicy nerkową.

#### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.
- Można stosować przez 3 miesiące po otwarciu opakowania. Po tym okresie pozostałość należy wyrzucić.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.