


## Cholinex 150 mg, 32 pastylki twarde



Cena: 20,61 zł

### Opis słownikowy

Dawka	150 mg
Opakowanie	32 pastylki twarde
Postać	pastylki twarde
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cholini salicylas

### Opis produktu

#### Wskazania

- Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, w tym ból i obrzęk gardła.
- Wspomaganie leczenia antybiotykiem zakażeń jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

#### Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
- Zwiększa wydzielanie śliny, przez co wspomaga działanie przeciwzapalne.

#### Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej pastylce od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę).
- Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

#### Skład

1 pastylka twarda zawiera substancję czynną: choliny salicylan 150 mg i substancje pomocnicze: sacharoza (1,8 g), glukoza ciekła (1,5 g), olejek miętowy.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną – salicylan choliny, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem).
- Fenylketonuria.

#### Działania niepożądane

- Rzadko – występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 osób ale częściej niż u 1 na 10 000 osób: reakcje alergiczne - zaczerwienienie skóry i wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu. Uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (ból brzucha, wymioty, krwawienia).
- Bardzo rzadko: u dzieci w wieku poniżej 12 lat po doustnym stosowaniu salicylanów może wystąpić zespół Rey`a, który objawia się: gwałtownymi obfitymi wymiotami, zaburzeniami świadomości (sennością lub pobudzeniem), śpiączką z drgawkami, nieprawidłowym oddychaniem (głębokie wdechy i wydechy), obniżeniem stężenia cukru we krwi (tzw. hipoglikemia), sinicą, stłuszczeniem i powiększeniem wątroby (stwierdzanym w biopsji).

#### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Chronić od wilgoci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.