

Coldrex Complex Grip 0,5g+6,1 mg, 16 kapsułek



Cena: 22,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5g+6,1mg+0,1g
Opakowanie	16 kapsułki
Postać	kapsułki twarde
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Phenylephrinum, Guaifenesinum

Opis produktu

Opis

Coldrex Complex Grip to lek w postaci kapsułek o kompleksowym działaniu na objawy przeziębienia i grypy, w tym kaszel mokry. Coldrex Complex Grip ułatwia odkrztuszanie i zawiera maksymalną dawkę paracetamolu w formie kapsułek (dotyczy 2 kapsułek stosowanych jednorazowo). Uwalnianie substancji czynnych rozpoczyna się po 5 minutach.

Wskazania

Coldrex Complex Grip zwalcza objawy przeziębienia i grypy takie jak:

- Gorączka
- Ból głowy
- Mokry kaszel
- Dreszcze
- Katar
- Ból gardła
- Ból

Działanie

- Paracetamol – działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
- Gwajafenezyna – rozrzedza zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie.
- Fenylefryna – obkurcza naczynia krwionośne i udrożnia przewody nosowe.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i starsza o masie ciała powyżej 50 kg: Zalecana dawka to 2 kapsułki co 4 do 6 godzin, w zależności od potrzeby, maksymalnie do 3 dawek w ciągu 24 godzin. Nie przekraczać zalecanej dawki. Nie należy przyjmować więcej niż 6 kapsułek (3g paracetamolu) w ciągu 24 godzin.

Skład

Każda kapsułka zawiera następujące substancje czynne: paracetamol (500 mg), gwajafenezyna (100 mg) i fenylefryny chlorowodorek (6,1 mg, co odpowiada 5 mg fenylefryny).

Pozostałe składniki leku to: skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, talk; kapsułka żelatynowa: żelatyna, sodu laurylosiarczan, żółcień chinolinowa (E104), indygotyna (E132), erytrozyna (E127), tytanu dwutlenek (E171), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować tego leku jeśli chora osoba ma:

- Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Chora jest w ciąży lub karmi piersią
- Schorzenia wątroby lub chorobę nerek, w tym alkoholową chorobę wątroby
- Chorobę serca lub zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia krwi, takie jak anemia (mała ilość czerwonych ciałek krwi)
- Nadciśnienie tętnicze
- Nadczynność tarczycy
- Cukrzycę
- Guz chromochłonny nadnerczy
- Jaskrę, w tym jaskrę z zamkniętym kątem
- Problemy z oddawaniem moczu
- Stosuje leki przeciwdepresyjne zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI) lub stosowała je w ciągu ostatnich 14 dni – to leki takie jak fenelzyna i izokarboksazyd
- Stosuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
- Stosuje beta-blokery
- Stosuje inne leki zawierające paracetamol
- Jeśli aktualnie przyjmuje inne leki obkurczające naczynia i leki stymulujące (np. efedryna, leki z grupy amfetamin i ksylometazolin).
- Stosuje leki tłumiące suchy kaszel.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie podawać dzieciom i młodzieży poniżej 16 roku życia.
- Do stosowania doustnego. Kapsułki połykać w całości, popijając wodą. Nie rozgryzać.
- Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, nasilają się lub występują inne objawy.