

# Coldrex Junior C, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 10 saszetek



Cena: 22,49 zł

## Opis słownikowy

Dawka	(300 mg + 5 mg + 20 mg)/saszetkę
Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek do sporządzania roztworu doustnego
Producent	OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Acidum ascorbicum, Phenylephrini hydrochloridum

## Opis produktu

### Opis

Coldrex Junior C, lek w postaci saszetek z proszkiem do sporządzania roztworu doustnego. Zawiera witaminę C. Lek działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz udrażnia nos.

### Wskazania

Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, kataru u dzieci w wieku 6-12 lat.

### Działanie

- Zwalcza gorączkę, bóle głowy i mięśni, a także niweluje dreszcze.
- Zmniejsza przekrwienia błony śluzowej nosa, udrażnia nos i zmniejsza uczucie nasilenia kataru.
- Witamina C uzupełnia niedobory, które mogą wystąpić na początku infekcji.

### Dawkowanie

- Rozpuścić w gorącej wodzie, dokładnie wymieszać i wypić bezpośrednio po przygotowaniu. W razie potrzeby można dodać zimnej wody lub dosłodzić.
- 1 saszетка produktu Coldrex Junior C, w razie konieczności po 4 godzinach dawkę można powtórzyć, do 4 razy na dobę.
- Nie stosować częściej niż co 4 godziny ani nie więcej niż 4 saszetki na dobę.
- Na objawy przeziębienia i grypy u dziecka należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku.
- Nie należy stosować dłużej niż 3 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

### Skład

1 saszетка zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrinihydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidumascorbicum) 20 mg.

### Przeciwwskazania

- Leki na przeziębienie dla dzieci nie mogą być stosowane jednocześnie z innymi środkami zawierającymi paracetamol.
- Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy oraz którekolwiek substancje pomocnicze zawarte w Coldrex Junior C. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.
- Nie można przyjmować jednocześnie z produktami leczniczymi takimi jak: zydowudyna, inhibitory monoaminooksydazy (MAO) oraz w okresie 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania.
- Nie można stosować leku Coldrex Junior C u dzieci poniżej 6 lat.

### Działania niepożądane

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) lub bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- Reakcji alergicznej (uczulenia) takiej jak: wysypka skórna lub swędzenie skóry, czasem połączonych z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy,
  - Wysypki skórnej lub złuszczenia się skóry, owrzodzenia jamy ustnej,
  - Problemów z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych,
- 
- Sińców lub krwawienia o nieznanym przyczynie,
  - Utraty wzroku, która może być spowodowana nadmiernie wysokim ciśnieniem śródgałkowym. Jest to bardzo rzadkie ale istnieje prawdopodobieństwo takiego zdarzenia u osób z jaskrą,
  - Nietypowego szybkiego tętna lub uczucia nieregularnego rytmu serca,
  - Trudności w oddawaniu moczu. Jest to bardziej prawdopodobne u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego,
  - Zaburzeń czynności wątroby (na co mogą wskazywać zażółcenie skóry i oczu, tkliwość wątroby).

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

- Ból głowy,
- Zawroty głowy,
- Bezsennaś,
- Nerwowość,
- Zwiększenie ciśnienia tętniczego,
- Nudności i wymioty.

### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.