

Contractubex (50 j.m. +100 mg + 10 mg)/ g, żel, 50 g



Cena: 66,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	(50 j.m. +100 mg + 10 mg)/ g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Allantoinum, Allii cepae extractum, Heparinum natricum

Opis produktu

Opis

Contractubex jest lekiem na blizny stosowanym po całkowitym wyleczeniu rany

Wskazania

Lek stosuje stosowany na blizny:

- ograniczające ruch,
- powiększone (przerostowe, obrzmiałe, o kształcie bliznowca),
- nieestetyczne blizny pooperacyjne,
- po amputacjach,
- pooparzeniowe i powypadkowe,
- przykurcze np. palców (przykurcz Dupuytrena),
- przykurcze ścięgien spowodowane urazami oraz kurczeniem się blizny.

Działanie

- Antyproliferacyjne,
- Przeciwzapalne,
- Wygładzające i rozluźniające tkankę blizny.

Dawkowanie

- Kilka razy na dobę, wcierając delikatnie w tkankę blizny, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
- W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć opatrunek z lekiem Contractubex na noc.
- W zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
- Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

Skład

Substancjami czynnymi leku są: heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli i alantoina.

Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Niewyleczone rany;
- Uszkodzona skóra;
- Błony śluzowe.

Działania niepożądane

- Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu zastosowania leczenia.
- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): świąd; rumień; rozszerzenie naczyń włosowatych na skórze; pogłębienie blizny.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): przebarwienie skóry; ścienienie skóry.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk; ból w miejscu podania; pokrzywka; wysypka; świąd; rumień; podrażnienie skóry; grudki; zapalenie skóry; pieczenie skóry; uczucie ściskania w skórze; nadwrażliwość (reakcja alergiczna); wysypka krostowa.

Przechowywanie

- W temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosować po całkowitym wyleczeniu rany.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.