

Contractubex, żel na blizny, 20 g



Cena: 35,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	(50 j.m. +100 mg + 10 mg)/ g
Opakowanie	20 g
Postać	żel
Producent	MERZ PHARMACEUTICALS GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Allantoinum, Allii cepae extractum, Heparinum natricum

Opis produktu

Wskazania

Lek na blizny stosowany po całkowitym wyleczeniu rany.

Działanie

- Antyproliferacyjne,
- Przeciwzapalne,
- Wygładzające i rozluźniające tkankę blizny.

Dawkowanie

Kilka razy na dobę, wcierać żel delikatnie w tkankę blizny. W przypadku blizn stwardniałych i zadawnionych można założyć opatrunek z lekiem Contractubex na noc.

Leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od wielkości blizny lub występowania przykurczu. Podczas leczenia świeżych blizn należy unikać bodźców fizycznych, takich jak: niskie temperatury, promieniowanie UV oraz zbyt silne wcieranie i inne podrażnienia mechaniczne.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: heparyna sodowa, wyciąg płynny z cebuli i allantoina.
- Substancje pomocnicze: kwas sorbinowy, metylu parahydroksybenzoesan, guma ksantan, makrogol 200, substancja poprawiająca zapach Fragrance 231616, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Niewyleczone rany;
- Uszkodzona skóra;
- Nie stosować na błony śluzowe.

Działania niepożądane

- Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu zastosowania leczenia.
- Często (występują u 1 do 10 osób na 100): świąd; rumień; rozszerzenie naczyń włosowatych na skórze; pogłębienie blizny.
- Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): przebarwienie skóry; ścienienie skóry.
- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): obrzęk; ból w miejscu podania; pokrzywka; wysypka; świąd; rumień; podrażnienie skóry; grudki; zapalenie skóry; pieczenie skóry; uczucie ściskania w skórze; nadwrażliwość (reakcja alergiczna); wysypka krostowa.
- Lek jest dobrze tolerowany, nawet podczas długotrwałego stosowania. Podczas stosowania leku obserwowano występowanie świądu, który jest wynikiem

zmian bliznowatych i nie wymaga przerwania leczenia.

Przechowywanie

- W temperaturze powyżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.