


Deflegmin 0,03 g/5ml, na zapalenie płuc i oskrzeli, syrop 120 ml



Cena: 13,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	30 mg/5ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum
Wiek	od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Deflegmin syropu jest lekiem mukolitycznym zawierającym chlorowoderek ambroksolu, który zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Wskazania

Deflegmin stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Dawkowanie

- U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni, 5 ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 5 ml syropu 2 razy na dobę;
- U dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę;
- U dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 1,25 ml syropu 3 razy na dobę;
- U dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 1,25 ml syropu 2 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowoderek. 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru. Pozostałe składniki: sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoesan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na chlorowoderek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Nie stosować bezpośrednio przed snem.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.