

# Deflegmin 75 mg, na zapalenie płuc i oskrzeli, 10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu



Cena: 17,51 zł

## Opis słownikowy

Dawka	75 mg
Opakowanie	10 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu
Postać	kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum

## Opis produktu

### Opis

Deflegmin, lek w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Jest lekiem mukolitycznym zawierającym ambroksolu chlorowodorek.

### Wskazania

Ostre o przewlekłe choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

### Działanie

Ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

### Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli: 1 kapsułkę na dobę, rano lub wieczorem, po jedzeniu, popijając niewielką ilością płynu.
- Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem.

### Skład

- Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. Jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu chlorowodoru.
- Pozostałe składniki leku to: sacharoza ziarenka, skrobia kukurydziana, szelak, powidon, talk; skład kapsułki żelatynowej: erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żelatyna.

### Przeciwwskazania

- Uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

- Leku w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

#### Działania niepożądane

- Reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła (obrzęk naczynioruchowy). Może to wywołać uczucie zaciskania w gardle, trudności w połykaniu i oddychaniu – częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana.
- Reakcje alergiczne dotyczące całego organizmu (reakcja anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny) – częstość występowania tego działania niepożądanego jest nieznana.
- Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona (ciężki stan, w którym dochodzi do obumierania i złuszczenia się naskórka) oraz martwica toksyczno-rozplywna naskórka (reakcja na lek, w której duże fragmenty naskórka oddzielają się od głębiej położonych warstw skóry; stan ten może dotyczyć także oczu, jamy ustnej, gardła i oskrzeli). W początkowej ich fazie mogą wystąpić niespecyficzne objawy grypopodobne, np. gorączka, dolegliwości bólowe, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Te działania niepożądane występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób).
- Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): nudności.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób): wymioty, biegunka, niestrawność i ból brzucha.
- Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): wysypka, pokrzywka.
- Działania niepożądane o częstości nieznanej (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): świąd, inne reakcje alergiczne niewymienione powyżej, uczucie suchości w drogach oddechowych, wodnisty wyciek z nosa, zgaga, uczucie suchości w jamie ustnej, ślinotok, zaburzenia w oddawaniu moczu.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25oC.
- W oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.