


Deflegmin Junior 15 mg/ 5 ml, na zapalenie płuc i oskrzeli, syrop 120 ml



Cena: 12,51 zł

Opis słownikowy

Dawka	15 mg/5ml
Opakowanie	120 ml
Postać	syrop
Producent	ICN POLFA RZESZÓW S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ambroxolum

Opis produktu

Opis

Deflegmin Junior w postaci syropu jest lekiem mukolitycznym zawierającym chlorowodorek ambroksolu. Deflegmin junior to lek w postaci syrop, można go stosować krótkotrwale u dzieci od 1 roku życia oraz u osób dorosłych w leczeniu mokrego kaszlu.

Wskazania

Deflegmin Junior stosuje się w ostrych i przewlekłych chorobach płuc oraz oskrzeli przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych.

Działanie

Deflegmin Junior w postaci syropu zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport, a dzięki temu ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: początkowo, przez 2 do 3 dni, 10 ml syropu 3 razy na dobę, następnie dawkę należy zmniejszyć do 10 ml syropu 2 razy na dobę;
- Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę;
- Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu 3 razy na dobę;
- Dzieci od 1 do 2 lat: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku. Pozostałe składniki: sorbitol roztwór, glicerol, glikol propylenowy, sodu benzoosan, woda oczyszczona, aromat maskujący, kwas solny 10% (do ustalenia pH).

Przeciwwskazania

- Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodrek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.;
- Nie stosować bezpośrednio przed snem.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Dodatkowe informacje

- Lek Deflegmin Junior w postaci syropu należy przyjmować po posiłkach.
- Syrop nie zawiera glutenu, ani laktozy