

Depremin 612 mg, 20 tabletek powlekanych



Cena: 26,90 zł

Opis słownikowy

Dawka	612 mg
Opakowanie	20 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	ZAKŁADY FARM. COLFARM
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Hyperici herba

Opis produktu

Opis

Depremin 612 mg, lek w postaci tabletek. Zawiera substancję czynną wyciąg suchy z ziele dziurawca. Przeznaczony dla osób dorosłych do krótkotrwałego leczenia objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów łagodnych zaburzeń depresyjnych.

Działanie

Łagodzenie zaburzeń depresyjnych.

Dawkowanie

- Dziennie: 1 tabletkę doustnie.
- Czas stosowania: 6 tygodni.
- Wystąpienia efektu terapeutycznego można oczekiwać w ciągu 4 tygodni leczenia. Jeśli objawy utrzymują się w trakcie stosowania leku, należy poradzić się lekarza.

Skład

- Substancja czynna: wyciąg suchy z ziele dziurawca (Hyperici herbae extractum siccum quantificatum)
- 1 tabletkę powlekana zawiera 612 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego, kwantyfikowanego) z Hypericum perforatum L., herba (ziele dziurawca) (DERpierwotny3- 6:1), co odpowiada: 0,6 mg – 1,8 mg sumy hiperycyn w przeliczeniu na hiperycynę, 36,72 mg – 91,80 mg sumy flawonoidów w przeliczeniu na rutynę, nie więcej niż 36,72 mg hiperforyny.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% (V/V).

- Pozostałe substancje pomocnicze to: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, mieszanina powlekająca Opadry II 85F32410 yellow (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E 172)).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki o działaniu zmniejszającym reakcję odrzucenia przeszczepu: cyklosporynę, takrolimus do użytku ogólnoustrojowego, leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV: amprenawir, indynawir i inne inhibitory proteazy, leki przeciwnowotworowe: irynotekan i leki przeciwzakrzepowe: warfarynę.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Depremin 612mg należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Podczas leczenia należy unikać ekspozycji na intensywne promieniowanie UV (ultrafioletowe).
- Dzieci poniżej 18. roku życia.

Działania niepożądane

- Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, alergiczne reakcje skórne, zmęczenie i niepokój. Częstotliwość ich nie jest znana.
- W trakcie intensywnego nasłonecznienia, u osób o jasnej karnacji mogą wystąpić nasilone objawy, takie jak dla oparzenia słonecznego.

Przechowywanie

- W sposób niedostępny dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu zdrowiu lub zdrowiu.