

Deslodyna fast Junior, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg, 10 tabletek



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	2,5 mg
Opakowanie	10 tabletek
Postać	tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Desloratadinum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Opis

Deslodyna fast junior to tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, zawiera 2,5 mg desloratadyny, która jest lekiem przeciwhistaminowym- przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia.

Wskazania

Deslodyna fast junior łagodzi:

- Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa- zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza, do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
- Łagodzi objawy związane z pokrzywką- stan skóry wywołany uczuleniem. Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: zalecana dawka to dwie tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka to jedna tabletki raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna. Jedna tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny (do regulacji pH), potasu wodorotlenek 50% (do regulacji pH), mannitol, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, aspartam (E 951), żelaza tlenek czerwony (E 172), aromat Tutti-Frutti SD

0272 (zawiera m.in. glikol propylenowy, alkohol benzylowy, cytral, geraniol, farnesol, linalol, d-limonen), magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.