

DicloGel żel 10 mg/g, 100 g



Cena: 11,69 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Dawka	10 mg/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum
Wiek	od 14 roku życia

Opis produktu

Opis

DicloGel jest lekiem w formie żelu zawierającym 10 mg diklofenaku sodowego w każdym gramie. Diclofenak należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Działanie jego polega na zahamowaniu aktywności cyklooksygenazy, a następnie na zahamowaniu syntezy prostaglandyn i innych mediatorów stanu zapalnego. Lek DicloGel jest przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 14 lat.

Wskazania

Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo w leczeniu:

- łagodnego do umiarkowanego bólu mięśni,
- kontuzji,
- bólu pourazowego.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: aplikować cienką warstwę żelu DicloGel na zmienione miejsca 3 do 4 razy na dobę, w zależności od potrzeby (około 2 do 4 gramów, ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) i delikatnie wcierać.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi nasilenie objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego. Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer 980, hydroksyetyloceluloza, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), która objawia się jako astma, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne, jeśli obrzęk naczynioruchowy jest wywoływany przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży;
- Jeśli u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek.
- Nie jest zalecana ekspozycja skóry leczonej lekiem Diclogel na działanie promieni słonecznych.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)

- wysypka skórna,
- zaburzenia skóry (wyprysk),
- zaczerwienienie skóry (rumień),
- zapalenie skóry w miejscu aplikacji objawiające się wysypką, obrzękiem lub guzkami (zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry),
- swędzenie skóry (świąd)

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób)

- rozległe zmiany na skórze z pojawieniem się zaczerwienienia, łuszczenia i dużych pęcherzyków (pęcherzowe zapalenie skóry),

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)

- wysypka skórna z pęcherzami wypełnionymi ropą (wysypka krostkowa),
- zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne (reakcja nadwrażliwości na światło),

Częstość nieznana

- uczucie pieczenia w miejscu zastosowania leku,
- suchość skóry,

Długotrwałe stosowanie leku Diclogel na dużej powierzchni ciała może powodować działania niepożądane również w innych obszarach ciała poza skórą, takie jak:

- nudności,
- wymioty,
- biegunka,
- bóle brzucha

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.